

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

NEEMYBACIN H
НЕМИБАЦИН Н

И А Л
ОДОБРЕНО
ДАТА 18.07.06.

**ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

- *Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.*
- *Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!*
- *Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.*

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Немибацин Н и за какво се прилага
2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Немибацин Н
3. Как се прилага Немибацин Н
4. Възможни нежелани реакции
5. Условия на съхранение
6. Допълнителна информация

Немибацин Н дерматична маз

Neomycin

Bacitracin

Hydrocortisone

Лекарствено вещество в 1 g маз: Neomycin sulfate екв. на 3,3 mg Neomycin, Bacitracin Zinc екв. на 0,25 mg Bacitracin, Hydrocortisone acetate 10 mg

Помощни вещества: течен парафин, бял вазелин

Немибацин Н дерматична маз 5 g се предлага в алуминиеви туби

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

Бул."Княгиня Мария Луиза" №2

1000 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Производител

Балканфарма Разград АД

Бул. "Априлско въстание" №68

Разград

България

Тел.: (+359 84) 660 999

Факс: (+359 84) 34 272



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕМИБАЦИН Н И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Немибацин Н дерматична маз е комбиниран продукт за локално приложение с изразено антимикробно и противовъзпалително действие.

Немибацин Н се прилага за лечение на:

- алергодерматози с екземни участъци: хронична екзема, атопичен дерматит, микробна екзема;
- кожни инфекции, причинени от чувствителни на продукта микроорганизми – фоликулити, импетиго;
- импетигинизирани възпалителни дерматози – скабиес, педикулоза, херпесни инфекции, микози.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С НЕМИБАЦИН Н

Немибацин Н не се прилага при установена свръхчувствителност към неомицин, бацитрацин-цинк, хидрокортизон ацетат или към някое от помощните вещества в продукта.

При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

Не е желателно използването на Немибацин Н продължително време поради опасност от нефро- и ототоксичност или развитие на свръхчувствителност. Да се избягва употребата на продукта в големи количества при третиране на инфицирани кожни изгаряния, трофични рани и други състояния поради възможност от резорбция и развитие на системни ефекти.

При поява на възпаление, сенсибилизация или суперинфекция е наложително да се прекрати лечението с Немибацин Н и се приложи съответна терапия.

Приложение на Немибацин Н и прием на храни и напитки

Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.

Бременност

Преди прием на каквото и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

Немибацин Н не трябва да се прилага в големи количества на обширни повърхности от кожата и за продължителен период от време при бременни и кърмачки.

Кърмене

Преди прием на каквото и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

Продуктът се прилага по преценка и под наблюдение на лекаря. Да не се прилага върху гърдите при кърмачки.

Шофиране и работа с машини

Немибацин Н не влияе върху способността за шофиране и работ



Приемане на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или скоро сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар

Немибацин Н дерматична маз е несъвместим със салицилова киселина, танин, тежки метали.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА НЕМИБАЦИН Н

Винаги приемайте Немибацин Н според инструкциите на лекуващия лекар!

Немибацин Н се прилага външно, върху кожата. Продуктът се нанася в тънък слой върху засегнатите участъци, 2-3 пъти дневно. Дневната доза за деца и възрастни не трябва да превишава 1 g. Курсът на лечение е с продължителност до 7 дни. Ако се налага повторно лечение максималната доза се намалява 2 пъти.

Ако имате впечатлението, че ефектът от приложението на Немибацин Н е по-силен от очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар или фармацевт!

Ако сте приели по-голямо количество от лекарството:

При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!

Няма данни за предозиране на продукта.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Немибацин Н може за предизвика нежелани лекарствени реакции

При продължително локално приложение на Немибацин Н понякога могат да се развитят алергични реакции.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25⁰C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след срока на годност, указан на опаковката!

Срок на годност: 3 (три) години

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД

Бул."Княгиня Мария Луиза"№2

1000 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Август 2005

