

Уважаеми пациенти,  
Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар или фармацевт.

**Наименование на лекарствения продукт:**

Piracebral® 1200  
/Пирацебрал 1200/

**Кое е активното вещество?**

1 филмирана таблетка съдържа 1200 mg piracetam.

**Какво друго съдържа Piracebral® 1200?**

Хипромелоза, макрогол 6000, магнезиев стеарат, повидон K25, пропилиенгликол, колоиден силициев двуокис, талк, оцветители титаниев диоксид (Е 171).

**Лекарствена форма и опаковка:**

Филмирани таблетки

Оригинална опаковка, съдържаща 30, 60 и 120 филмирани таблетки.

**Кой е отговорен за продажбата на Piracebral® 1200?**

Hexal AG  
Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Germany  
Tel.: 0049 8024/908-0; Telefax: 0049 8024/908-1290

**Кой е отговорен за производството на Piracebral® 1200?**

Salutas Pharma GmbH  
Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Germany

**Какво представлява Piracebral® 1200?**

Piracebral® 1200 е продукт, повлияващ нарушените мозъчни функции (ноотропен лекарствен продукт).

**За какво се използва Piracebral® 1200?**

- Симптоматично лечение на психо-органичен синдром със следните прояви: нарушение на паметта, нарушение на вниманието и липса на мотивация.
- Лечение на последствия от исхемични мозъчно-съдови инциденти, по-специално афазия.
- Лечение на кортикален миоклонус (внезапни неволеви мускулни съкращения), самостоятелно или в комбинация.
- Лечение на вертиго (световъртеж и шум в ушите) и свързаните с него нарушения на равновесието, с изключение на замаяност от психичен произход.
- Лечение на дислексия (нарушения в способността за четене) при деца в комбинация с подходящи мерки, като говорна терапия.



# ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

## Piracebral® 1200

стр. 2 от 5

### Забележка:

Преди да се започне лечение с Piracebral® 1200 таблетки е необходимо да се изясни дали симптомите на заболяването са свързани с основното заболяване, което изиска специфично лечение.

### **Кога не трябва да приемате Piracebral® 1200 таблетки?**

Piracebral® 1200 не трябва да се прилага при:

- известна свръхчувствителност към пирацетам, други структурно подобни субстанции (пиролидонови производни) или някоя от другите съставки
- мозъчни кръвоизливи
- бъбречна недостатъчност в напреднал стадий

### **В какви случаи можете да използвате Piracebral® 1200 само след консултация с лекар?**

При определени състояния или необходимост от специални грижи е необходимо да прилагате Piracebral® 1200 само след консултация с Вашия лекар.

При случаи на психомоторно нарушение, Piracebral® 1200 може да се прилага само при спазване на всички предпазни мерки.

### **Какви специални предпазни мерки трябва да се вземат?**

Необходимо е повишено внимание, когато Piracebral® 1200 се прилага при пациенти с нарушено кръвосъсирване, големи операции или тежки кръвоизливи.

При пациенти с бъбречна недостатъчност се препоръчва стриктно да се проследяват стойностите на остатъчния азот или креатинин.

### **Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Piracebral® 1200 или могат да бъдат повлияни от продукта?**

Моля, обърнете внимание, че тази информация може да се отнася също и за насърко приети лекарствени продукти.

Поради влиянието на пирацетам върху кръвосъсирването е възможно да се повиши ефектът на кумариновите производни (продукти за потискане на кръвосъсирването).

Възможно е да се засили действието на лекарствени продукти, стимулиращи централната нервна система, невролептици (продукти, прилагани при някои психични заболявания) и хормони на щитовидната жлеза при понижена функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм).

### **Какви специални предпазни мерки трябва да се вземат при бременност и кърмене?**

Няма достатъчно данни за приложението на пирацетам по време на бременност. Ако се установи бременност по време на лечение с пирацетам, лекуващият лекар трябва да бъде своевременно уведомен, за да прецени дали да бъде продължено или преустановено лечението. Не е известно дали пирацетам преминава в майчиното мляко. Пирацетам не трябва да се прилага по време на кърмене.



## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Piracebral® 1200

стр. 3 от 5

**С какво да се съобразявате при шофиране, при работа с машини или в несигурно положение (напр. изкачване по стълби)?**

Поради индивидуално различните реакции е възможно да се наруши способността за бърза реакция в началото на лечението и при повишаване на дозата.

### **Дозировка, начин и продължителност на приложение:**

Ако няма друго предписание на Piracebral® 1200 от Вашия лекар, се препоръчва следната дозировка. Моля, придържайте се към указанията за употреба, тъй като в противен случай продуктът няма да действа правилно.

Дозировката зависи от вида и тежестта на клиничната картина, както и от индивидуалната реакция към лечението.

### **В каква доза и колко често можете да приемате Piracebral® 1200 таблетки?**

*За лечение на дементни синдроми при възрастни се прилагат следните дозировки:*

1 филмирана таблетка Piracebral® 1200 2 пъти дневно (съответстващи на 2,4 г пирацетам дневно).

По лекарско предписание дозировката може да бъде повишена до 2 филмирани таблетки Piracebral® 1200 2 пъти дневно (съответстващи на 4,8 г пирацетам).

### *Лечение на последствия от исхемични цереброваскуларни инциденти, по-специално афазия:*

В подострия стадий и при хроничните форми (вече установени най-малко след 15 дни) дневната доза варира от 4,8 до 6 г.

### *Лечение на миоклонус с кортикален произход:*

Трябва да се започне с 7,2 г дневно, да се увеличава с 4,8 г дневно на всеки 3 до 4 дни до максимум 24 г дневно, като дневната доза се разпредели на 2 или 3 приема.

Лечението с други антимиоклонични лекарства трябва да се провежда при същата дозировка. В зависимост от постигнатия клиничен резултат, ако е възможно дозировката на други такива лекарства трябва да се намали.

След започване на лечението с piracetam, то трябва да продължи докато персистира основното церебрално заболяване.

При пациенти с оствър епизод, след време може да се наблюдава спонтанна еволюция и на всеки 6 месеца трябва да се опитва намаляване на дозата или прекъсване на лечението. Това трябва да става чрез намаляване дозата на piracetam с 1,2 г на всеки два дни (на всеки 3 или 4 дни при Lance and Adams syndrome), с цел предотвратяване възможността за внезапно влошаване или нов пристъп.

### *Лечение на вертиго:*

Препоръчителната дневна доза варира от 2,4 г до 4,8 г, разделена на 2 или 3 приема.

### *Лечение на дислексия в комбинация с говорна терапия:*

При деца над 8 години и юноши препоръчителната дневна доза е около 3,2 г, разделена на два приема.



## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Piracebral® 1200

стр. 4 от 5

### Забележка:

Пирацетам, активната субстанция на Piracebral® 1200, не се разгражда в черния дроб. Не се препоръчва друга дозировка при пациенти с нарушенa чернодробна функция.

Тъй като пирацетам се отделя основно чрез бъбреците, при понижена бъбречна функция могат да се наблюдават повишени плазмени нива. Препоръчва се следното: при лека до умерена бъбречна недостатъчност (серумен креатинин до 3 mg %) – 1/2 от терапевтичната доза, при тежка бъбречна недостатъчност (серумен креатинин между 3 и 8 mg %), която не подлежи на диализа – 1/4 до 1/8 от дозата.

Piracebral® 1200 е противопоказан при напредната бъбречна недостатъчност.

### **Кога и как можете да приемате Piracebral® 1200?**

Piracebral® 1200 се приема с чаша с вода (или друга течност) по възможност по време или непосредствено след хранене.

### **Колко дълго можете да прилагате Piracebral® 1200?**

Лекарят трябва да определи при всеки отделен случай продължителността на лечението.

При комбинирано лечение на дементни синдроми след 3 месеца е необходимо да се прецени дали е необходимо продължаване на лечението.

### **Какво трябва да предприемете, ако Piracebral® 1200 е бил приет в много големи количества (преднамерено или неумишлено предозиране)?**

Пирацетам, активната съставка на Piracebral® 1200, е нетоксична. Описаните нежелани лекарствени реакции могат да възникнат при увеличаване на дозата. Моля, информирайте Вашия лекар при такива случаи, за да може той/тя да предприеме необходимите мерки.

### **Какво трябва да направите, ако сте приемали по-малко от предписаната доза Piracebral® 1200 или сте пропуснали приема на продукта?**

Продължете приема, както е предписано.

### **Какво трябва да знаете, ако сте прекъснали лечението или сте го прекратили преждевременно?**

Не са необходими специални мерки, в случай че Piracebral® 1200 се прилага, както е предписан.

### **Какви нежелани реакции може да предизвика приложението на Piracebral® 1200?**

Ако наблюдавате нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка, моля консултирайте се незабавно с Вашия лекуващ лекар или фармацевт:

По време на лечение с Piracebral® 1200 при възрастни не често могат да се наблюдават повишена психомоторна активност, нарушения в съня и безсъние, нервност, депресивно настроение, тревожност, агресивност, стомашно-чревни оплаквания (гадене, повръщане в областта на корема, диария), напълняване.



## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Piracebral® 1200

стр. 5 от 5

Рядко се наблюдава световъртеж, мускулна слабост, повищено и понижено кръвното налягане, повищено либидо и повищена сексуалност.

В отделни случаи са съобщени главоболие, нарушения в координацията, обърканост, халюцинации, сънливост и алергични реакции (напр. реакции на свръхчувствителност, уртикария, зачерявания на кожата, сърбеж, повищено изпотяване).

Нежеланите лекарствени реакции при възрастни са съобщавани по-често при дози от около 5 g пирацетам/ден. При деца подобни нежелани лекарствени реакции са били наблюдавани по-често при дози от около 3 g пирацетам/ден.

### Забележка:

В отделни случаи при предразположени пациенти (невронална хипервъзбудимост), желаната синхронизация и стимулация на електрическата активност на мозъка може да доведе до по-нисък гърчов праг.

### **Какви мерки трябва да бъдат взети във връзка с нежеланите лекарствени реакции?**

Ако наблюдавате нежелани лекарствени реакции, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, за да предприеме необходимите мерки.

При първи признания на реакции на свръхчувствителност приложението на Piracebral® 1200 трябва незабавно да бъде спряно.

### **Инструкции за съхранение:**

Срокът на годност на лекарството е напечатан върху опаковката.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

### **Дата на последната редакция на листовката:**

Септември 2003

