



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като в нея се съдържа важна за Вас информация. Ако искате да научите повече за този продукт или част от информацията в листовката не Ви е ясна, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Tylol® / Тайлол®

Paracetamol

Перорална суспензия

ИАЛ
ОДОБРено!
ДАТА 04.07.06

Какво съдържа Tylol®?

Всяка доза от 5 ml Tylol® перорална суспензия съдържа 120 mg Paracetamol (Парацетамол).

Помощни вещества: алюминиево-магнезиев силикат, авицел RC 591, карбокси метил натриева целулоза, захар, глицерин, сорбитол 70%, лимонена киселина монохидрат, метил параксихидроксибензоат, пропил параксихидроксибензоат, малинова есенция и дейонизирана вода. Оцветител Е 122.

Лекарствена форма и опаковка

Tylol® е перорална суспензия, която може да намерите в бутилка от 100 ml. В кутията има мерителна лъжичка с вместимост 5 ml.

Кой притежава разрешение за употребата на Tylol® в България?

NOBEL İLAC SANAYİ ve TİCARET A.S.

Barbaros Bulvari 76-78

34353 Beşiktaş, İSTANBUL, Turkey

Кой произвежда Tylol®?

NOBELFARMA İLAC SANAYİ ve TİCARET A.S.

Sancaklar Koyu 81100 / Duzce, Turkey

Какво представлява Tylol®?

Tylol® перорална суспензия съдържа paracetamol, който облекчава болката и понижава високата температура. Болкоуспокояващото действие на paracetamol се осъществява чрез повишаване прага на болката, а температуропонижаващият му ефект се дължи на въздействие върху центъра за регулация на температурата в хипоталамуса (определената част от мозъка).

За какво се използва Tylol®?

Tylol® перорална суспензия се използва за облекчаване на лека до умерена болка от различен произход - главоболие, невралгия, зъббол, болка при никнене на зъбки, възпалено гърло, както и за понижаване на телесната температура при различни възпалителни състояния, простуда и грип, детски инфекции и в резултат на постvakцинална реакция при деца над 2-месечна възраст.



Какво трябва да знаете преди детето ви да започне да приема Tylol®?

Консултирайте се с лекар преди детето ви да започне да приема Tylol® перорална суспенсия, в случай че:

- Детето ви е алергично към paracetamol или към някое от помощните вещества на лекарството;
- Страда от редки проблеми като вродена непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбация или захарозо-изомалтазна недостатъчност;
- Страда от заболявания на бъбреците или черния дроб, сърдечни, белодробни увреждания и предшестваща анемия.

Какво трябва да знаете докато детето ви приема Tylol®?

Не давайте на детето си други лекарства, съдържащи paracetamol, докато то приема Tylol® перорална суспенсия..

Tylol® може да се прилага едновременно с лекарства за лечение на епилепсия, но трябва да се има предвид, че в този случай Tylol® може да не повлияе достатъчно болката или температурата. Едновременният прием на някои лекарства за лечение на депресия, успокоителни, лекарства за епилепсия, както и големи количества алкохол, увеличава вероятността от поява на нежелани лекарствени реакции, предизвикани от paracetamol. Ако не сте сигурни дали може да използвате Tylol® заедно с друго лекарство, непременно потърсете съвета на лекар.

Бременност и кърмене

Tylol® перорална суспенсия е предназначен за приложение при деца.

В случай, че се приема от бременни и кърмачки е необходим лекарски контрол.

Влияе ли Tylol® на способността за шофиране и работа с машини?

Tylol® перорална суспенсия е предназначена за деца.

В случай, че се използва от възрастни, няма данни Tylol® да повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Как се приема Tylol®?

Tylol® перорална суспенсия се приема през устата.

Tylol® перорална суспенсия не се разрежда.

Разклаща се преди употреба.

Препоръчителната дозировка на Tylol® е дадена по-долу:

| Възраст | Доза paracetamol |
|------------------------|--|
| Кърмачета над 2 месеца | Само в случай на повишаване на температурата след имунизация – 1/2 мерителна лъжичка (2,5 ml), до 2 пъти дневно. Не давайте на детето повече от 2 дози без да се |



| | |
|-----------------------------------|---|
| | посъветвате с лекар. При други случаи не употребявайте TyloI® перорална супенсия при бебета под 3-месечна възраст без да се консултирате с лекар. |
| Кърмачета от 3 месеца до 1 година | 1/2 – 1 мерителна лъжичка (2,5 – 5 ml), до 4 пъти дневно |
| Деца от 1 до 6 години | 1 – 2 мерителни лъжички (5 – 10 ml), до 4 пъти дневно |
| Деца от 6 до 12 години | 2 – 4 мерителни лъжички (10 – 20 ml), до 4 пъти дневно |
| Възрастни и деца над 12 години | 4 – 8 мерителни лъжички (20 – 40 ml), до 4 пъти дневно |

Не превишавайте препоръчаната доза.

Дозите не бива да бъдат прилагани през интервал по-малък от 4 часа, но не повече от 4 дози за 24 часа.

TyloI® перорална супенсия не трябва да се прилага повече от 3 последователни дни без лекарска консултация.

Какво да направите при предозиране?

Ако смятате, че детето ви е приело повече от препоръчаната доза, независимо потърсете лекарска помощ, независимо от факта, че то може да се чувства добре, тъй като приемът на прекалено голямо количество paracetamol може да доведе до увреждане на черния дроб. Най-честите симптоми на предозиране се изразяват с гадене, повръщане и коремни болки.

Какви нежелани лекарствени реакции може да причини **TyloI®**?

В терапевтични дози, обикновено paracetamol се понася добре. В редки случаи може да предизвика алергични реакции, като например обрив и сърбеж. Много рядко при продължителен прием на по-високи дози може да се наблюдават различни промени в кръвната картина.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ.

Как се съхранява **TyloI®**?

ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

Да се употребява до 6 месеца след отваряне на опаковката.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се пази от светлина и влага.

Регистрационен №:

Дата на последна редакция на листовката: юли 2006 г.