

ИАЛ  
ОДОБРЕНОІ  
ДАТА 18.07.06г.

Информация за пациентта  
Виброцил

Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна информация за пациента.

- Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
- Попитайте Вашия фармацевт, ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет.
- Обърнете се към лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 5 до 7 дни.

**В тази листовка:**

1. Какво е Виброцил?
2. За какво се използва Виброцил?
3. Какво трябва да проверите, преди да употребявате Виброцил?
4. Как да използвате Виброцил?
5. Какви нежелани лекарствени реакции може да предизвика Виброцил?
6. Как да съхранявате Виброцил?

**1. Какво е Виброцил?**

Виброцил съдържа като активни съставки назален деконгестант (фенилефрин) и антихистамин (диметинден малеат). Виброцил се използва за облекчаване на симптомите на запушване и хрема от носа.

Виброцил се предлага под формата на капки, спрей и гел.

Виброцил капки за нос и спрей съдържат 0.25% фенилефрин и 0.025% диметинден малеат като активни съставки. Те се състоят също от бензалкониев хлорид (консервант), натриев фосфат, лимонена киселина, сорбитол, дегерпентирана есенция от лавандула, пречистена вода.

Виброцил гел съдържа 0.25% фенилефрин и 0.025% диметинден малеат като активни съставки, както и бензалкониев хлорид (консервант), натриев фосфат, лимонена киселина, сорбитол, дегерпентирана есенция от лавандула, метилхидроксипропилцелулоза, пречистена вода.

Виброцил се произвежда от Novartis Consumer Health SA, CH 1260 Nyon, Switzerland.

Притежател на разрешението за употреба е Novartis Consumer Health SA, CH 1260 Nyon, Switzerland.

**2. За какво се използва Виброцил?**

Виброцил съдържа назален деконгестант и антихистамин. Той осигурява бързо и сълготрайно облекчение на запушването и хремата в носа, предизвикани от широк



кръг инфекциозни или алергични нарушения на горните отдеи на дихателния тракт. Той подпомага освобождаването на носните проходи, облекчавайки хремата и отока. Виброцил не променя активността на носните цили.

Виброцил се използва за облекчаване на конгестията в случай на простуда, остър и хроничен ринит, сенна хрема или друг алергичен ринит (алергия към домашен прах, животинска козина и гр.), вазомоторни ринити и синуити. Виброцил се употребява като допълнителна терапия при лечение на възпаление на ушите.

Виброцил може да ще бъде предписан от лекар за пре- и постоперативни грижи при хирургични интервенции на носа.

### 3. Какво трябва да проверите, преди да използвате Виброцил?

Прочетете следната информация, преди да употребявате Виброцил.

Не използвайте Виброцил:

- ако сте алергичен към някоя от съставките;
- ако страдате от атрофичен ринит (заболяване на носната лигавица с хронично възпаление и образуване на крусти);
- ако вземате или сте вземали през последните 2 седмици лекарство по лекарско предписание, съдържащоmonoаминооксидазен инхибитор (МАО инхибитори, които се използват за лечение на депресия и други психични заболявания). Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Виброцил, ако не сте сигурни дали лекарството ще съдържа МАО инхибитор.

Какви предпазни мерки да вземете, преди да употребявате Виброцил?

5 капки Виброцил съдържат 5 мг сорбитол. Пациенти с рядка форма на наследствена непоносимост към фруктозата не трябва да ползват този продукт.

Ако сте бременна или кърмите

Употребата на Виброцил не се препоръчва по време на бременност и кърмене.

Други медицински проблеми

Информирайте вашия лекар, ако имате сърдечно заболяване, високо кръвно налягане, заболяване на щитовидната жлеза или глаукома.

Консултирайте се с вашия лекар, ако приемате антидепресанти или лекарства за високо кръвно налягане (например бета-блокери).

Какво да помните при употребата на Виброцил?

Не използвайте Виброцил в продължение на повече от 1 седмица. Ако симптомите продължават, информирайте вашия лекар.

Не надвишавайте препоръканата доза, особено при деца и много възрастни пациенти.



#### **4. Как да използвате Виброцил?**

##### **Канку за нос**

Деца от 1 до 6 год.: 1 до 2 канку във всяка ноздра 3 до 4 пъти дневно.

Възрастни и деца над 6 год.: 3 до 4 канку във всяка ноздра 3-4 пъти дневно.

##### **Спрей**

Възрастни и деца над 6 год.: 1 до 2 впръсквания във всяка ноздра 3 до 4 пъти дневно.

##### **Гел**

Възрастни и деца над 6 год.: прилагайте малки количества от гела възможно най-дълбоко във всяка ноздра 3-4 пъти дневно. Препоръчва се да направите последната апликация непосредствено преди лягане.

Виброцил гел е особено полезен при сухота на носната лигавица и наличие на крусти.

#### **Инструкции за употреба**

##### **Виброцил канку**

Издухайте си носа. Отметнете максимално назад главата, докато стоите. Ако сте легнали, провисете глава отстрани на леглото. Поставете канкуте във всяка ноздра и задръжте главата назад няколко минути, така че лекарството да се разпредели в носа.

За бебета със запушен нос се препоръчва канкуте да се поставят вечер преди хранене за подпомагане на кърменето.

##### **Виброцил спрей**

За да постигнете фин спрей, небулайзерът трябва да се държи в изправено положение с апликатора, сочещ нагоре. Издухайте носа. С изправена глава вкарайте апликатора в ноздрата, кратко и рязко стиснете бутонката и извадете апликатора от ноздрата, преди да отпуснете напрежението. Поещете въздух, въпреки че в процеса на впръскване носът осигурява оптимално разпределение на спрея.

**Какво да правите, ако сте поели твърде много Виброцил?**

При инцидентно предозиране информирайте незабавно вашия лекар или фармацевт.

#### **5. Какви нежелани лекарствени реакции може да предизвика Виброцил?**

Едновременно с желаните си ефекти лекарствата могат да предизвикват и някои нежелани. Обикновено Виброцил се понася много добре. Могат да се наблюдават редки и транзиторни случаи на леко локално чувство на парене или сухота в носа.

Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако забележите някакъв друг нежелан ефект, който не е описан по-горе, но вие смятате, че може да се дължи на употребата на Виброцил.



## **6. Как да съхранявате Виброцил?**

Дръжте Виброцил далеч от досънта на деца.

**Условия на съхранение**

Не съхранявайте над 30° С.

Съхранявайте Виброцил на място, защитено от пряка светлина.

**Как се доставя Виброцил?**

**Виброцил капка за нос**

15 мл тъмна стъклена бутилка с канифол.

**Виброцил спрей за нос**

Контеинер за впръскване, съдържащ 10 мл от продукта.

**Виброцил гел**

Алуминиева туба с вътрешно протектично покритие. Съдържа 10-15 г от продукта.

**Срок на годност**

Не използвайте Виброцил след изтичане срока на годност, отбелаязан върху опаковката.

**Дата на информацията**

Тази листовка е одобрена през септември 2003 г.

