



Информация за пациента

Telfast® 180

Телфаст 180

Fexofenadine

Какво представлява Вашето лекарство?

Името на Вашето лекарство е Телфаст 180.

Всяка таблетка съдържа 180mg активно вещество fexofenadine hydrochloride.

Помощни вещества: microcrystalline cellulose, pregelatinise maize starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hypromellose, povidone, titanium dioxide (E171), colloidal silicon dioxide, Macrogol 400 и iron oxide (E172).

Какво трябва да знаете за Телфаст 180?

Фексофенадин хидрохлорид, активното вещество на Телфаст 180, е продукт от групата лекарства, наречени антихистамини.

Производител и притежател на разрешението за употреба е

SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main

За какво е предназначен Телфаст 180?

Телфаст 180 съдържа фексофенадин хидрохлорид, който е антихистамин.

Антихистамините облекчават симптоми като сърбеж, подуване,зачервяване, които съществват алергичните кожни оплаквания при хронична идиопатична уртикария.

Кога не трябва да използвате Телфаст 180?

НЕ ВЗЕМАЙТЕ Телфаст 180, ако някога сте имали реакция към фексофенадин или към някое от помощните вещества (виж списъка на помощните вещества в "За какво е предназначен Телфаст 180").

Преди да вземете Вашето лекарство

Преди да вземете Вашето лекарство винаги информирайте лекуващия си лекар или фармацевт, ако:

- сте бременна
- може да сте бременна
- кърмите

Бременност и кърмене

Няма достатъчно данни за употребата на фексофенадин хидрохлорид при бременни жени.Ограниченните проучвания при животни не откриват директни или индиректни ефекти по отношение на бременността,



15.VIII.06
[Handwritten signature]

ембрионалното/феталното развитие, раждането и постнаталното развитие (виж сек. 5.3). Фексофенадин хидрохлорид не трябва да се използва по време на бременност, освен ако това е наложително.

Кърмене

Приложен при кърмачки фексофенадин преминава в кърмата. Поради това фексофенадин хидрохлорид не се препоръчва за жени, които кърмят децата си.

Шофиране и Телфаст 180

Проучванията показват, че Телфаст 180 не предизвиква съниливост, така че може да шофирате, докато се лекувате с Телфаст 180. Може да има обаче редки изключения на появя на съниливост. Ето защо трябва да се уверите, че Вие не сте повлияни по този начин и не получавате съниливост, преди да шофирате или да изпълнявате задачи, които изискват концентрация.

Как да вземате Вашето лекарство?

Вземайте таблетките си с вода. Може да ги приемате с или без храна. Ако използвате лекарство против киселини, съдържащо алуминий и магнезий, препоръчва се да предвидите около 2 часа между времето, в което вземате Телфаст 180 и лекарството. Това се прави, защото то може да повлияе действието на Телфаст 180, като понижи количеството на резорбираното лекарство.

Възрастни и деца над 12 години:

Вземете по една таблетка веднъж дневно.

Ако случайно вземете твърде много таблетки, обърнете се към Вашия лекар за съвет или отидете в най-близката болница.

След като вземате Вашето лекарство

Нежелани лекарствени реакции

При контролирани клинични проучвания повечето често съобщавани нежелани събития са били главоболие (7.3%), съниливост (2.3%), гадене (1.5%), замайване (1.5%). Честотата на тези събития, наблюдавани с фексофенадин, е била подобна на честотата на наблюдаваните в групата с плацебо.

В редки случаи са съобщавани инциденти (с честота под 1%) при

контролираните проучвания, подобни на тези при плацебо и от

постмаркетингови проучвания, като: умора, безсъние, нервност и трудно

заспиване или паронира, като кошмари. В редки случаи са докладвани: обрив,

уртикария, сърбеж и реакции на свръхчувствителност, проявени с ангиоедем,

стягане в гърдите, диспнея, зачервяване на кожата и системна анафилаксия.



Ако забележите нещо необичайно или имате някакви неочеквани ефекти,
кажете на Вашия фармацевт или лекуващия си лекар.

Как да съхранявате Вашето лекарство?

Не употребявайте Вашето лекарство след датата, отбелязана върху опаковката.
Съхранявайте Вашето лекарство на място, недостъпно за деца.

Дата на последна редакция на листовката
Март 2006

