

**ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
ДИАБ / DIAB**

**И А Л
О Д О Б Р Е Н О !
ДАТА 06.06.06г.**

Моля прочетете тази листовка внимателно преди да започнете приема на това лекарство.

Тази листовка съдържа информация, касаеща този лекарствен продукт.

Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, попитайте личния си лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка, може да поискате да я прочетете отново по-късно.

Името на вашето лекарство е Диаб. То съдържа лекарственото вещество gliclazide.

Какво съдържа Вашето лекарство?

Таблетките Диаб са бели, кръгли с делителна черта от едната страна и надпис G25 от другата. Всяка таблетка съдържа 80mg gliclazide. Таблетката съдържа също така и помощни вещества: лактозаmonoхидрат, силиконов диоксид, прежелатинизирано царевично нишесте, талк и магнезиев стеарат.

Диаб се предлага в опаковка по 60 таблетки.

Притежател на разрешение за употреба:

"Чайка фарма — висококачествените лекарства" АД,
ул. "Н.И. Вапцаров" 1,
гр. Варна 9000
България

Производител:

"Чайка фарма - висококачествените лекарства" АД,
бул. "Санкт Петербург" 53,
гр. Пловдив 4000
България

За какво се използват таблетки Диаб?

Вашият лекар е установил, че имате завишени нива на кръвната захар (diabetes mellitus). Диаб се използват за лечение на неинсулинов зависим диабет (тип 2) при възрастни, когато само диетата, физическото натоварване и намаляването на телесното тегло не са достатъчни за постигане на гликемичен контрол. Диаб съдържат gliclazide, което е хипогликемично сулфанилурейно лекарствено средство. Сулфанилуреята действа чрез стимулиране на отделянето на инсулин от бета клетките и по този начин намалява нивата на кръвната захар в кръвта Ви.

Преди да започнете приема на Вашето лекарство Диаб:

Предупредете Вашия лекар ако:

- Имате чернодробни или бъбречни проблеми;



- Алергични сте към сулфанилуреини или производни на тях продукти;
- Имате лактазна недостатъчност, галактоземия и глюкозогалактозен малабсорбционен синдром, тъй като едно от помощните вещества в таблетките е лактоза;
- Сте бременна или планирате бременност;
- Предстои Ви операция;
- Не сте навършили 14 години;
- Страдате от някакъв тип инфекция;

Приемате ли други лекарства:

Приемът на други лекарства може да повлияе действието на Gliclazide, и по тази причина е важно да уведомите Вашия лекар или фармацевт за всички лекарства, които приемате, например за:

- високо кръвно налягане (ACE-инхибитори - като еналаприл; бета блокери – като атенолол, пропранолол, които могат да маскират предупредителните симптоми на хипогликемията);
- проблеми със сърцето като ангина или сърдечна недостатъчност;
- високи нива на холестерола;
- проблеми с щитовидната жлеза;
- ревматизъм, артрит;
- подагра;
- нарушения в състоянието на кръвта (ако приемате антикоагуланти например)
- перорални противозачатъчни таблетки (естрогени, прогестини)
- депресия или емоционални проблеми;
- язва;
- астма (бета 2 миметици – например салбутамол; теофилин; кофеин)

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Gliclazide ако приемате и други лекарствени средства.

Прием на алкохол:

Алкохола повишава хипогликемичното действие на Диаб, което може да доведе до поява на хипогликемична кома.

Да се избягва консумацията на алкохол и лекарства, съдържащи алкохол.

Бременност и кърмене:

Диаб преминава през плацентата и може да причини хипогликемия при новородени. Задължителна е консултацията с лекар и избор на ново лекарство.

По време на терапията с Диаб кърменето е противопоказано.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на кърмене и да е лекарство, включително и такива, отпусканни без рецептa.



Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:

Ако имате симптоми, дължащи се на ниски стойности на кръвната захар (хипогликемия), не трябва да шофирате или работите с машини. Ниски нива на кръвната захар може да се наблюдават в началото на лечението, когато Вашият лекар се опитва да определи подходящата за Вас доза. Вашият лекар ще Ви даде по-нататъшни съвети. Когато нивото на кръвната захар се стабилизира, можете да шофирате и да работите с машини.

Как да приемате Вашето лекарство?

Винаги приемайте толкова таблетки, колкото ви е предписан лекарят. В началото това може да бъде половин или една таблетка дневно. Лекарят може да повиши дозата Ви само ако нивата на кръвната захар не се понижат.

Ако сте приели повече от необходимата доза Диаб?

В случай на предозиране незабавно потърсете Вашия лекар.

Хипогликемия се появява, ако приемете свръхголяма доза Диаб (хипогликемията е състояние с рязко спадане стойностите на кръвната захар). Ако почувствате изпотяване, силен глад, треперене, пребледняване, зрителни нарушения, или ако се почувствате зле или проявите необичайно поведение, хапнете незабавно малко захар или нещо сладко и се консултирайте с Вашия лекар.

Хипогликемията се появява по-често, ако Вашата диета е твърде стриктна или небалансирана, след продължително или силно физическо натоварване, след консумация на алкохол или след приемане на друго хипогликемизиращо средство.

Затова ако приемате Диаб Вие трябва да сте сигурни:

- *че ще се храните редовно*: важно е да имате редовни основни хранения, включително закуска. Никога не трябва да пропускате някое от основните хранения, поради повишаване риска от хипогликемия, при положение че Вашата диета включва недостатъчно захар или е небалансирана по отношение на захарта.
- *че ще приемате редовно лекарството*, за предпочтение по време на хранене (за да се избегнат стомашно-чревни нарушения).

При тежки хипогликемични реакции (с кома и конвулсии), пациентът трябва да се отведе до най-близката болница, за да се потърси спешна медицинска помощ.

Пациентът и неговите близки трябва да бъдат запознати със симптомите, характеризиращи състоянието на хипогликемия.

Таблетките Gliclazide трябва да се вземат веднага след ядени, след



закуската или след първото основно ядене за деня. В случай, че забравите да вземете таблетките, изчакайте докато дойде времето за следващия прием и след това продължете както обикновено. Ако вземете прекалено много таблетки незабавно потърсете помощ от Вашия лекар.

Нежелани реакции, дължащи се на Вашето лекарство

Както и всички лекарства, Gliclazide може да причини някои нежелани лекарствени реакции. Леко виене на свят, сърцебиене и изпотяване на длани на ръцете могат да означават, че нивата на кръвната захар са много ниски и че дозата от Gliclazide не е правилната за Вас. Ако това се случи на Вас, незабавно уведомите Вашия лекар.

Може също така да изпитате някои нежелани реакции като например стомашно разстройство, леко неразположение, диария или запек, но всичко това може да се избегне ако приемате лекарството по време на хранене.

Може да имате сърбеж или да получите кожен обрив. Може да получите синини или да кървите по-лесно. Много рядко може да се стигне до анемия и/или броят на белите кръвни клетки да се намали. Трябва да информирате Вашия лекар ако забележите някой от тези ефекти.

Рядко се наблюдава жълтеница (пожълтяване на кожата) или чернодробни проблеми или хепатит по време на лечението с Gliclazide.

Ако забележите това, незабавно информирайте Вашия лекар.

Ако имате други проблеми, за които мислите, че са вследствие на Вашето лекарство, моля уведомете Вашия лекар.

Как да съхранявате Вашето лекарство

Да се съхранява под 25°C.

Не използвайте Вашето лекарство след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Дата на актуализиране на текста: Април 2006

