

PENESTER® / ПЕНЕСТЕР

ИАЛ
ОДОБРЕНОІ
ДАТА 08.08.06г.

Състав

Лекарствено вещество

Finasteride 5 mg в 1 филмирана таблетка.

Помощни вещества

Лактозаmonoхидрат, царевично нишесте, повидон 30, докусат натрий, натриева сол на карбоксиметил нишесте, магнезиев стеарат, хидроксипропил метилцелулоза 2910/5, мацрогол 6000, талк, титаниев диоксид, симетикон емулсия SE4, жълт железен оксид.

Лекарствена форма и опаковка

Филмирани таблетки

Съдържание на 1 опаковка:

30 филмирани таблетки

Притежател на разрешението за употреба

Зентива АД

Прага, Чешка Република

Фармакотерапевтична група

Инхибитор на 5-алфа-редуктазата

Действие

Вашият лекар Ви е предписал Пенестер защото Вие имате доброкачествена хиперплазия на простатата. Вашата простата, която е жлеза близо до пикочния мехур, е уголемена. Поради това са се появили затруднения при уриниране. Доброкачествената хиперплазия на простатата е широко разпространена при мъжете на възраст над 50 години и с възрастта нейното разпространение нараства. При някои мъже доброкачествената хиперплазия на простатата може да предизвика сериозни проблеми, включващи инфекции на пикочната система, внезапна невъзможност да уринирате (остро задържане на урина), така както и необходимост от хирургическа намеса. Развитието и нарастването на простатата и последващата хиперплазия на простатата зависят от трансформацията на тестостерона, мъжки полов хормон, до дихидротестостерон в простатата.

Пенестер се прилага за лечение и стабилизиране на доброкачествената хиперплазия на простатата. Пенестер предизвиква намаляване на уголемената простата и облекчава



описаните по-горе затруднения при уриниране. Пенестер ефективно понижава концентрацията на дихидротестостерон, както в кръвта, така и в простатата.

По време на продължително клинично наблюдение на пациенти, лекувани с дневна доза от 5 mg финастерид – лекарственото вещество, съдържащо се в Пенестер – потискането на дихидротестостерона е свързано с понижаващ се риск от появата на внезапна невъзможност за уриниране и необходимостта от хирургическа интервенция. По-нататък това е свързано с облекчаване на затрудненията при уриниране, усилване на уринната струя и намаляване на размера на простатата. Резултатите потвърждават, че финастерид връща обратно развитието на доброкачествена хиперплазия на простатата при мъже с увеличена простата.

Показания

Пенестер се прилага за лечение на доброкачествена хиперплазия на простатата.

Пенестер помага за намаляване на риска от появата на остро задържане на урина (внезапна невъзможност за уриниране) и необходимостта от хирургическа интервенция.

Противопоказания

Пенестер не трябва да се прилага при известна свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарствения продукт. Това заболяване се появява само при мъже, ето защо Пенестер не е предписан за употреба при жени и деца.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Информирайте Вашия лекар за всички оплаквания, свързани със здравословното Ви състояние в момента и за тези, които сте имали в миналото, както и за всички алергии.

Ако вземете твърде много таблетки, консултирайте се с Вашия лекар.

Лекарствени взаимодействия

Пенестер и другите лекарствени продукти обикновено не си влияят взаимно. Независимо от това, Вашият лекар трябва да бъде информиран за всички лекарствени продукти, които приемате в момента или възнамерявате да приемате, включително и тези, които се продават без лекарско предписание.

Ако друг лекар Ви предпише някакво друго лекарство, информирайте го, че вече използвате Пенестер.

Пенестер може да повлияе резултатите от едно изследване на кръвта, наречено ПСА (тест за специфичен простатен антиген). Ако ще провеждате такъв тест, информирайте лекаря, че използвате Пенестер.

Бременност и кърмене

Бременни жени и жени, които може би са бременни, не трябва да използват Пенестер, нито дори да докосват счупени или натрошени таблетки. Ако лекарственото вещество, съдържащо се в Пенестер, бъде погълнато или се абсорбира през кожата на

жена, бременна с дете от мъжки пол, това вещество може да увреди половите органи на детето. Ако бременна жена има контакт с лекарственото вещество, съдържащо се в Пенестер, трябва да се консултира с лекар. Таблетките Пенестер са филмированi и при нормални условия, ако не са счупени или натрошени, не е възможно осъществяване на контакт с лекарственото вещество.

Дозировка и начин на приложение

Вземайте Пенестер така както Ви е предписал Вашият лекар. Обичайната доза е една таблетка дневно с или без храна.

Доброкачествената хиперплазия на простатата се развива за продължителен период от време. При някои пациенти се наблюдава бързо подобрене, но е възможно Вие да трябва да използвате този продукт поне 6 месеца преди Вашите затруднения при уриниране да започнат да намаляват. Пенестер може да лекува Вашите симптоми и да стабилизира заболяването Ви само, ако Вие го употребявате дълго време. Дали Вие ще забележите някакво отслабване или промяна в симптомите или не, лечението с този продукт може да намали риска от невъзможност за уриниране, така както и риска от необходимост от хирургическа интервенция. Вие трябва да посещавате редовно Вашия лекар, така че развитието на Вашето заболяване да бъде следено и оценявано.

Използвайте Пенестер в съответствие с указанията на лекаря. Ако пропуснете една доза не вземайте една таблетка повече. Продължете съгласно обичайната схема.

Предозиране


В случай на предозиране или инцидентно погълдане на таблетките от дете, консултирайте се с лекар.

Нежелани лекарствени реакции

Пенестер се понася много добре. Нежеланите лекарствени реакции не са чести и повечето мъже не са засегнати.

Импотенция (невъзможност за ерекция) или намаляване на сексуалната активност могат да са нежелани лекарствени реакции. При някои мъже може да се появят промени в или затруднения с еякулацията, като намалено количество на еякулата (количеството сперма), отделен при полов акт. Това намалено количество на еякулата, обаче изглежда не влияе на нормалните полови функции. В някои случаи тези нежелани реакции отшумяват дори когато пациента продължи да приема лекарствения продукт. Ако тези симптоми персистират, обикновено след прекъсване на лечението изчезват. Освен това, оток на гърдите и/или повишена чувствителност на гърдите могат да се появят при някои мъже. Алергични реакции като обрив, сърбеж, уртикария (копривна треска), оток на устните и лицето са наблюдавани при някои мъже; също и болка в тестикулите.

В случай на някоя от изброените по-горе нежелани лекарствени реакции или на никакви други необичайни реакции, консултирайте се с Вашия лекар.



Съхранение

Няма специални изисквания за съхранение.

Срок на годност

3 години

Внимание

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

Да не се използва след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Последна редакция: 140504

Адрес за контакти

ТП ЗЕНТИВА ИНТЕРНЕШЪНъЛ АД
бул. "Н. Й. Вапцаров" № 25, София 1407
тел. 9 62 41 91, 9 62 41 40

