

ИАЛ  
ОДОБРЕН О!  
ДАТА 28.05.2005

## Bekunis Herbal Tea / Бекунис Билков чай

### **Състав**

1 чаена лъжичка (1.2g) чай съдържа:

**Лекарствени вещества:** Sennae Folium 0,72 g (стандартизиирани като хидроксиантраценови гликозиди, изчислени като Sennoside B 18 mg)

**Помощни вещества:** листа от мента (Menthae piperitae folium); цветът хибискус (Hibisci flores cum calyxes); листа от къпина (Rubii fruticosi folium)

### **Лекарствена форма и съдържание**

Оригиналната опаковка съдържа 55g билков чай.

### **Действие**

Растителен лекарствен продукт с лаксативно действие.

### **Производител и притежател на разрешението за употреба**

roha arzneimittel GmbH  
Rockwinkeler Heerstrasse 100  
D-28355 Bremen  
Germany

### **Показания**

За непродължителна употреба при констипация (запек).

### **Противопоказания**

Bekunis Herbal Tea не трябва да се употребява при свръхчувствителност към лекарственото или към някое от помощните вещества; в случаи на чревна непроходимост (илеус), остри възпалителни заболявания на червата, напр. болестта на Crohn, улцерозен колит и апендицит, стомашни болки с неизвестен произход; при случаи на тежка дехидратация с нарушение във водно-електролитния баланс; при деца на възраст под 12 години.



## **Лекарствени взаимодействия**

В случай на хронична употреба или злоупотреба, е възможно засилване на ефекта на сърдечните гликозиди, както и повлияване на действието на антиаритмичните лекарства, поради загуба на калий. Загубата на калий също така може да се увеличи и при едновременното приложение с тиазидни диуретици, кортикоステроиди и Radix Liquiritiae (сладък корен).

## **Специални предупреждения за употреба**

Bekunis Herbal Tea не трябва да се употребява повече от 1-2 седмици, без консултация с лекар.

Продължителната употреба може да обостри констипацията.

При пациенти с инконтиненция трябва да се избягва продължителен контакт между кожата и изпражненията, като често се сменя пелената или памперсите.

В случай, че симптомите продължат или състоянието се влоши, пациентът трябва да се обърне към лекар.

През първите три месеца от бременността, Bekunis Herbal Tea трябва да се употребява само, ако констипацията не може да бъде преодоляна чрез промяна в начина на хранене или с прибавка на баластни вещества.

## **Бременност и Кърмене**

Употребата на Bekunis Herbal Tea по време на бременност и кърмене трябва да става след предварителна консултация с лекар.

Малки количества от разградните продукти на сената, които притежават лаксативен ефект (напр. реин) преминават в майчиното мляко. Не е наблюдаван лаксативен ефект при кърмачетата.

## **Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Няма данни за промяна в способността за шофиране и работа с машини.

## **Начин на отпускане**

Без лекарско предписание.

## **Дозировка, начин на прием и продължителност на употреба**

Ако не е предписано друго, приемайте  $\frac{1}{2}$  - 1  $\frac{1}{2}$  чаена лъжичка (0,6-1,8 g) от Bekunis Herbal Tea дневно. Залейте билковия чай с чаша вряща вода (около 150ml) и го оставете да престои в продължение на 5-20 минути. Прецедете получния извлек и го изпийте на малки гълътки. Препоръчително е чаят да се приема вечер преди лягане.



## **Предозиране и други грешки при употреба**

Острата интоксикация с перорални лаксативни лекарства се характеризира най-вече с тежка диария, в някои случаи придружена с тежко чревно раздразнение, което може да бъде съпроводено със сериозна водно-електролитна загуба. Това може да доведе до хипокалиемия (загуба на калий) и болезнени мускулни спазми. Ако коликите и повишенията газообразуване са първоначално преобладаващи симптоми, при определени обстоятелства клиничната картина може да наподобява тази на остър хирургически корем. Хроничната злоупотреба с лаксативни лекарства се характеризира преди всичко с хипокалиемия (загуба на калий) и често с мускулна отпадналост.

**Първична медицинска помощ:** Възстановяване на водно-електролитния баланс.

**Ако пропуснете един прием, не се притеснявайте!**

**Вземете следващата доза в определеното време. Не дублирайте дозата!**

## **Нежелани лекарствени реакции**

В отделни случаи могат да възникнат спазматични стомашно-чревни разстройства. Възможна е появата на свръхчувствителност, проявяваща се с кожни реакции. При тези обстоятелства е необходимо дозата да се намали. В случай на хронична употреба или злоупотреба е възможна повищена загуба на вода и соли, особено на калиеви соли. Освен това е възможна появата на албуминурия и хематурия, както и лъжлива пигментация на чревната мукоза (*pseudomelanosis coli*), която е безвредна и обикновено изчезва след прекратяване на употребата на чая. Загубата на калий може да доведе до смущения в сърдечната функция и до мускулна слабост, особено в случаи на едновременно приложение със сърдечни гликозиди, тиазидни диуретици и кортикоステроиди.

Ако забележите някои други нежелани лекарствени реакции, неописани в указанията за употреба, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

**НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЕКУНИС НЕРБАЛ ТЕА СЛЕД ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА!**

**Срок на годност : 3 години**

Да се съхранява при температура под 25° C!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

**Дата на последна редакция на листовката**

Май 2004

