

Листовка за пациента

Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация.

Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва да го използвате внимателно за да получите най-добри резултати от него.

- Пазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Питайте Вашия фармацевт, ако се нуждаете от повече информация или от съвет.
- Вие ще трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако симптомите се влошат или ако не се подобрите след 3 дни.

В тази листовка:

1. Какво е Septolet Lemon и за какво се използва
2. Преди да започнете да приемате Septolet Lemon
3. Как да приемате Septolet Lemon
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Съхранение на Septolet Lemon
6. За по-пълна информация

Septolet Lemon lozenges 1.2 mg

Cetylpyridinium chloride

Септолете Лимон таблетки за смучене 1.2 mg

Цетилпиридин хлорид

Антисептик за уста и гърло

с аромат на лимон

- Активно вещество: cetylpyridinium chloride.
- Помощни вещества: течен малтитол, манитол, левоментол, лимоново масло, глицерол, рициново масло, натурално, силициев диоксид, безводен, магнезиев стеарат, повидон, аромат на липа, аромат на лимон, аромат на портокалово масло, оцветители: Е 171, Е 100, капол 600 фарма, малтитол.

Производител и притежател на разрешението за употреба
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenia.

1. КАКВО Е SEPTOLETE LEMON ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?
Всяка таблетка за смучене съдържа 1.2 mg cetylpyridinium chloride.



Тези таблетки за смучене се предлагат в кутии по 18. Кутиите съдържат 2 блистъра по 9 таблетки за смучене. Таблетките за смучене са жълти на цвят, кръгли и леко биконвексни.

Таблетките за смучене Septolet Lemon притежават локално антимикробно действие. Те съдържат антисептика cetylpyridinium chloride, който разрушава редица бактерии и гъби и със сигурност до голяма степен подтиска развитието на някои вируси. Таблетките за смучене облекчават възпалението в устата и гърлото, но най-вече те предпазват от развитие на тежки бактериални възпаления. Благодарение на своите добри овлажняващи свойства и ниско повърхностно напрежение, cetylpyridinium chloride прониква също през части на оралната и фарингеалната лигавица, които е трудно да се достигнат и подтиска бактериалния растеж.

Таблетките за смучене Septolet Lemon имат приятен и освежаващ вкус на лимон. Те не съдържат захар, от която се нуждаят бактериите за своя растеж, по тази причина те не причиняват разрушаване на зъбите и ефектът на антисептиците е много по-добър.

Таблетките за смучене се препоръчват:

- За локално лечение на леки инфекции на устата и гърлото (фарингит, ларингит, начало на ангина),
- При възпаление на венците и устната лигавица (стоматит, гингивит),
- При симптоми на простуда и грип като болка, сухота и дразнене в гърлото, лош дъх при възпалителни процеси в устната кухина и гърлото, пресинталост.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ SEPTOLETE LEMON

Не приемайте Septolet Lemon:

- ако сте свръхчувствителни (алергични) към cetylpyridinium chloride или някое от помощните вещества на Septolet Lemon.

Обърнете специално внимание при прием на Septolet Lemon:

- ако имате отворени раны в устата, защото cetylpyridinium chloride забавя заздравяването на раните.
- Ако имате тежка инфекция, придружена с висока температура, главоболие и повръщане, трябва да се консултирате с лекар и по-специално, ако състоянието не се подобри след 3 дни.
- Ако сте диабетик трябва да имете предвид, че всяка таблетка за смучене съдържа 1 g maltitol. Поради слабата си хидролиза и абсорбция в стомашно-чревния тракт, maltitol повлиява слабо нивото на кръвната захар.

Не се препоръчва да се приемат по-високи дози от предписаните.

Таблетките за смучене не се препоръчват за деца под 4 годишна възраст.

**Прием на Septolet Lemon с храна и течности:**

Не трябва да приемате таблетките за смучене непосредствено преди хранене и едновременно с мляко.

Бременност

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приемането на какъвто и да било лекарствен продукт.

Поради ограничени данни относно безопасността на лекарствения продукт по време на бременност, употребата му не се препоръчва.

Кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приемането на какъвто и да било лекарствен продукт.

Поради ограничени данни относно безопасността на лекарствения продукт по време на кърмене, употребата му не се препоръчва.

Шофиране и управление на машини:

Няма съобщени случаи за влияние на таблетките за смучене Septolet Lemon върху способността за шофиране и управление на машини.

Специални предупреждения да някои от помощните вещества на Septolet Lemon :

Таблетките за смучене съдържат естествен оцветител, затова те могат да избледнеят с течение на времето, ако се съхраняват на светло.

Таблетките за смучене съдържат полиоли (малтитол, манитол), които могат да причинят диария при високи дози. Високите дози глицерол могат да причинят главоболие и стомашно-чревни нарушения.

Прием на други лекарствени продукти:

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или вече сте приели някои други лекарствени продукти, дори и такива, които се отпускат без рецепт.

Няма съобщения за лекарствени взаимодействия на таблетите за смучене Septolet Lemon с други лекарствени продукти.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМАТ SEPTOLETE LEMON

Винаги приемате Septolet Lemon съгласно лекарските препоръки. Вие трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт ако не сте сигурни как да ги приемате. Обичайната доза за възрастни и деца над 12 годишна възраст е 8 таблетки за смучене дневно. Разтваряйте по 1 таблетка за смучене в устата на всеки 2 до 3 часа.



За деца над 4 годишна възраст се препоръчват до 4 таблетки за смучене дневно, докато при деца от 10 до 12 годишна възраст – до 6 таблетки за смучене дневно. Разтваряте по 1 таблетка в уста на всеки 3 до 4 часа.

Не приемайте таблетките за смучене непосредствено преди или по време на хранене.

Ако имате впечатление, че ефектът на Septolet Lemon е твърде силен или твърде слаб, се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако приемете повече Septolet Lemon отколкото трябва

Имайки предвид количеството на активното вещество във всяка таблетка за смучене, възможността от предозиране е минимална. Приемането на голям брой таблетки за смучене може да причини стомашно-чревни нарушения като гадене, повръщане и диария. В такива случаи трябва да спрете приема на лекарствения продукт, да приемете по-голямо количество вода или мляко и да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако забравите да приемете Septolet Lemon:

Не взимайте двойна доза, с която да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарствени продукти и Septolet Lemon може да причини нежелани реакции.

Ако приемате лекарствения продукт съгласно препоръките, нежелани реакции се наблюдават рядко. При чувствителни хора, по-високи от предписаните дози, могат да причинят стомашно-чревни нарушения поради дразнене на стомашно-чревните лигавични мембрани. Признания на свръхчувствителност (алергия) към лекарствения продукт се наблюдават в много редки случаи.

Ако забележите каквито и да било нежелани реакции, дори и такива неспоменати в тази листовка, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА SEPTOLETE LEMON

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да се пази от светлина и влага. Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Срок на годност

Не трябва да използвате лекарствения продукт след срока на годност, отбелязан на опаковката.



Без лекарско предписание.

Дата на последна корекция

15 декември 2004

6. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

За по-пълна информация, моля, свържете се с местния представител на производителя и притежателя на разрешението за употреба.

Представителство в България
KRKA, София, ул “Якубица” 19
Тел. 02 962 34 50
info@krka.bg

Тази листовка е одобрена

