

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 23.09.2006

Информация за пациенти

Листовка за пациента

Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация.

Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва да го използвате внимателно за да получите най-добри резултати от него.

- Пазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Питайте Вашия фармацевт, ако се нуждаете от повече информация или от съвет.
- Вие ще трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако симптомите ви се влошат или ако не се подобрите след 3 дни.

В тази листовка:

1. Какво е Septolet Cherry и за какво се използва
2. Преди да започнете да приемате Septolet Cherry
3. Как да приемате Septolet Cherry
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Съхранение на Septolet Cherry
6. За по-пълна информация

Septolet Cherry lozenges 1.2 mg

Cetylpyridinium chloride

Септолете Череша таблетки за смучене 1.2 mg

Цетилпиридин хлорид

Антисептик за уста и гърло

с аромат на череша

- Активно вещество: cetylpyridinium chloride.
- Помощни вещества: течен малитitol, манитол, левоментол, лимоново масло, глицерол, рициново масло, натурално, силициев диоксид, безводен, магнезиев стеарат, повидон, аромат на череша, оцветители: Е 120, Е 171, капол 600 фарма, малитitol.

Производител и притежател на разрешението за употреба

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenia.

1. КАКВО Е SEPTOLET CHERRY И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Всяка таблетка за смучене съдържа 1.2 mg cetylpyridinium chloride.

Тези таблетки за смучене се предлагат в кутии по 18. Кутиите съдържат 2 блистъра по 9 таблетки за смучене. Таблетките за смучене са виолетови на цвят, кръгли и леко биконвексни.

- Таблетките за смучене Septolet Cherry притежават локално антимикробно действие. Те съдържат антисептика cetylpyridinium chloride, който разрушава редица бактерии и гъби и със сигурност до голяма степен подтиска развитието на вирусите. Таблетките за смучене дезинфекцират устата и гърлото, като облекчават възпалението в устата и гърлото, но най-вече те предпазват от развитие на тежки бактериални възпаления. Благодарение на своите добри овлажняващи свойства и ниско повърхностно напрежение, cetylpyridinium chloride прониква също и през части на оралната и фарингеалната лигавица, които е трудно да се достигнат и подтиска бактериалния растеж.

Таблетките за смучене Septolet Cherry имат приятен и освежаващ вкус на череша. Те не съдържат захар, от която се нуждаят бактериите за своя растеж, по тази причина те не причиняват разрушаване на зъбите; ефектът на антисептиците е много по-добър когато е на основата на липса на захар.

Таблетките за смучене се препоръчват:

- За локално лечение на леки инфекции на устата и гърлото (фарингит, ларингит, начало на ангина),
- При възпаление на венците и устната лигавица (стоматит, гингивит),
- При симптоми на простуда и грип като болка, сухота и дразнене в гърлото, лош дъх при възпалителни процеси в устната кухина и гърлото, пресипналост.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ SEPTOLETE CHERRY

Не приемайте Septolet Cherry:

- ако сте свръхчувствителни (алергични) към cetylpyridinium chloride или някое от помощните вещества на Septolet Cherry.

Обърнете специално внимание при прием на Septolet Cherry:

- ако имате отворени рани в устата защото cetylpyridinium chloride забавя заздравяването на раните.
- Ако имате тежка инфекция, придружена с висока температура, главоболие и повръщане, трябва да се консултирате с лекар и по-специално, ако състоянието не се подобри след 3 дни.
- Ако сте диабетик трябва да имете предвид, че всяка таблетка за смучене съдържа 1 g maltitol. Поради слабата си хидролиза и абсорбция в стомашно-чревния тракт, maltitol повлиява слабо нивото на кръвната захар.

Не се препоръчва да се приемат по-високи дози от препоръчаните.

Таблетките за смучене не се препоръчват за деца под 4 годишна възраст.

Прием на Septolet Cherry с храна и течности:

Не трябва да приемате таблетките за смучене непосредствено преди хранене и едновременно с мляко.

Бременност

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приемането на какъвто и да било лекарствен продукт.

Поради ограничени данни относно безопасността на лекарствения продукт по време на бременност, употребата му не се препоръчва.

Кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приемането на какъвто и да било лекарствен продукт.

Поради ограничени данни относно безопасността на лекарствения продукт по време на кърмене, употребата му не се препоръчва.

Шофиране и управление на машини:

Няма съобщени случаи за влияние на таблетките за смучене Septolet Cherry върху способността за шофиране и управление на машини.

Специални предупреждения за някои от помощните вещества на Septolet Cherry:

Таблетките за смучене съдържат естествен оцветител, затова те могат да избледнеят с течение на времето, ако се съхраняват на светло.

Таблетките за смучене съдържат полиоли (малтитол, манитол), които могат да причинят диария при високи дози. Високите дози глицерол могат да причинят главоболие и стомашно-чревни нарушения.

Прием на други лекарствени продукти:

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или вече сте приели някои други лекарствени продукти, дори и такива, които се отпускат без рецептa.

Няма съобщения за лекарствени взаимодействия на таблетите за смучене Septolet Cherry с други лекарствени продукти.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМАТ SEPTOLET CHERRY

Винаги приемате Septolet Cherry съгласно лекарските препоръки. Вие трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт ако не сте сигурни как да ги приемате. Обичайната доза за възрастни и деца над 12 годишна възраст е 8 таблетки за смучене дневно. Разтваряйте по 1 таблетка за смучене в устата на всеки 2 до 3 часа.

За деца над 4 годишна възраст – се препоръчват до 4 таблетки за смучене дневно, докато при деца от 10 до 12 годишна възраст – до 6 таблетки за смучене дневно. Разтваряте по 1 таблетка в уста на всеки 3 до 4 часа.

Не приемайте таблетките за смучене непосредствено преди или по време на хранене.

Ако имате впечатление, че ефектът на Septolet Cherry е твърде силен или твърде слаб, се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако приемете повече Septolet Cherry отколкото трябва

Имайки предвид количеството на активното вещество във всяка таблетка за смучене, възможността от предозиране е минимална. Приемането на голям брой таблетки за смучене може да причини стомашно-чревни нарушения като гадене, повръщане и диария. В такива случаи трябва да спрете приема на лекарствения продукт, да приемете по-голямо количество вода или мляко и да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако забравите да приемете Septolet Cherry:

Не взимайте двойна доза с която да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарствени продукти и Septolet Cherry може да причини нежелани реакции.

Ако приемате лекарствения продукт съгласно препоръките, нежелани реакции се наблюдават рядко. При чувствителни хора, по-високи от предписаните дози, могат да причинят стомашно-чревни нарушения поради дразнене на стомашно-чревните лигавични мембрани. Признания на свръхчувствителност (алергия) към лекарствения продукт се наблюдават в много редки случаи.

Ако забележите каквито и да било нежелани реакции, дори и такива, неспоменати в тази листовка, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА SEPTOLETE CHERRY

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да се пази от светлина и влага. Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Срок на годност

Не трябва да използвате лекарствения продукт след срока на годност, отбелязан на опаковката.

Информация за предписване
Без лекарско предписание.

Дата на последна корекция
15 декември 2004

6. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

За по-пълна информация, моля свържете се с местния представител на производителя и притежателя на разрешението за употреба.

Представителство в България
KRKA, София, ул “Якубица” 19
Тел. 02 962 34 50
info@krka.bg

Тази листовка е одобрена

