

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 07.11.06

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

CellCept 250 mg capsules
микофенолат мофетил

СелСепт 250 мг капсули
микофенолат мофетил

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате други въпроси, моля, запитайте вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано за вас. Не трябва да го давате на други. То може да бъде вредно за тях, даже и ако техните симптоми са същите като вашите.
- *Ако някой от нежеланите ефекти стане сериозен или ако забележите нежелани ефекти, които не са споменати в тази листовка, моля кајсете на лекуващия си лекар или фармацевт.*

В тази листовка:

1. Какво представлява CellCept и за какво се използва
2. Преди да вземете CellCept
3. Как да прилагате CellCept
4. Възможни нежелани ефекти
5. *Как да се съхранява CellCept*
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CELLCEPT И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

CellCept капсули се използва, за да предотврати отхвърлянето от Вашия организъм на присадените бъбреци, сърце или черен дроб. CellCept се прилага заедно с други лекарства, известни като циклоспорин и кортикоステроиди.

2. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ CELLCEPT

Не вземайте CellCept:

- Ако сте *алергични (свръхчувствителни)* към микофенолат мофетил, микофенолова киселина или към някоя друга съставка на CellCept.
- *Ако кърмите.*

Вземете специални предпазни мерки при употреба на CellCept:



Трябва да информирате незабавно лекуващия си лекар:

- Ако получите симптоми на инфекция (напр. повишена температура, болки в гърлото), неочаквано насиняване и/или кървене.
- Ако имате или някога сте имали проблеми с храносмилателната система, напр. язва на стомаха.

CellCept намалява защитните сили на организма ви. Поради това съществува повишен рисък от рак на кожата. Ето защо трябва да ограничите излагането на слънце и ултравиолетова светлина, като носите подходящо защитно облекло и използвате слънцезащитни продукти с висок защитен фактор.

Прием на други лекарства:

Моля, уведомете лекуващия си лекар или фармацевта, ако вземате или насърко сте вземали други лекарства, освен тези, които са ви предписани.

Ако отговорът на някой от следните въпроси е “да”, консултирайте се с лекуващия си лекар преди да започнете да вземате CellCept:

- Употребявате ли лекарства, съдържащи: азатиоприн или други продукти, подтискащи имунната система (които понякога се дават на болните след операция за трансплантиране), колестирамин (използван за лечение на болни с висок холестерол в кръвта), антиациди (лекарства, намаляващи стомашната киселина) или някакви други лекарства (включително тези, които можете да си купите без рецепт), за които лекуващият Ви лекар не знае?
- Нуждаете ли се от ваксиниране (живи ваксини)? Вашият лекар ще ви посъветва какво е показано за вас.

Прием на CellCept с храна и напитки:

Приемът на храна и напитки не повлиява лечението ви със CellCept.

Бременност и кърмене

Не приемайте CellCept докато кърмите.

Вашият лекар трябва да Ви посъветва да използвате противозачатъчни средства преди да започнете лечението със CellCept, докато се лекувате със CellCept и в продължение на шест седмици след като престанете да го прилагате. Това е необходимо, защото CellCept може да увреди нероденото бебе. Веднага уведомете лекуващия си лекар, ако сте бременна, кърмите, забременеете или планирате да започнете семеен живот в близко бъдеще.

Шофиране и работа с машини:

Не е установено, че CellCept уврежда способността ви да шофирате или да работите с машини.



3. КАК ДА ВЗЕМАТЕ CELLCEPT

Винаги вземайте CellCept точно както лекуващият лекар ви е казал. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте лекуващия си лекар или фармацевта. Обичайният начин на употреба на CellCept е следният:

Трансплантиация на бъбрец

Възрастни:

Първата доза ще ви се даде до 72 часа след операцията за трансплантиация. Препоръчваната дневна доза е 8 капсули (2 г от лекарственото вещество), разделени в два отделни приема. Това означава да вземете 4 капсули сутрин и след това 4 капсули вечер.

Деца (на възраст от 2 до 18 години):

Дозата ще варира в зависимост от размерите на детето. Вашият лекуващ лекар ще определи най-подходящата доза въз основа на повърхността на тялото (височина и тегло). Препоръчваната доза е 600 mg/m^2 два пъти дневно.

Трансплантиация на сърце

Възрастни:

Първата доза ще ви се даде до 5 дни след операцията за трансплантиация. Препоръчваната дневна доза е 12 капсули (3 г от лекарственото вещество), разделени в два отделни приема. Това означава да вземете 6 капсули сутрин и след това 6 капсули вечер.

Деца:

Няма достатъчно данни, за да се препоръча употребата на CellCept при деца, на които е извършена трансплантиация на сърце.

Трансплантиация на черен дроб

Възрастни:

Първата доза ще ви се даде най-малко 4 дни след операцията за трансплантиация, когато вие ще можете да приемате лекарства през устата. Препоръчваната дневна доза е 12 капсули (3 г от лекарственото вещество), разделени в два отделни приема. Това означава да вземете 6 капсули сутрин и след това 6 капсули вечер.

Деца:

Няма достатъчно данни, за да се препоръча употребата на CellCept при деца, на които е извършена трансплантиация на черен дроб.



Метод и път на приложение

Прегълтнете капсулите цели с чаша вода. Не ги чупете и не ги размачквайте и не вземайте капсули, които са отворени или разделени. Избягвайте контакт с праха, разсипан от увредените капсули. Ако капсулата се отвори случайно, измийте праха от кожата си със сапун и вода. Ако прах влезе в очите или устата ви, изплакнете обилно с обикновена прясна вода.

Лечението ще продължи докато се нуждаете от подтискане на имунната система за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантирания орган.

Ако вземете повече CellCept отколкото трябва:

Ако вземете повече капсули, отколкото ви е казано, или ако някой друг случайно вземе вашето лекарство, консултирайте се с лекар или отидете веднага в болницата.

Ако забравите да вземете CellCept:

Ако някога забравите да вземете лекарството, вземете го веднага след като си спомните, след това продължете да го вземате в обичайното време.

Ако спрете приема на CellCept:

Спиранието на лечението със CellCept може да увеличи възможността за отхвърляне на трансплантирания ви орган. Не спирайте приема на лекарството си, освен ако лекуваният лекар не ви каже.

Ако имате още въпроси относно употребата на този продукт, попитайте лекуващия си лекар.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ

Както всички лекарства, CellCept може да има нежелани ефекти, *въпреки че не всички ги получават*. Някои от по-обичайните проблеми са диария, намаление на белите кръвни телца и/или на червените кръвни телца в кръвта ви, инфекция и повръщане. Вашият лекар ще извършва редовни изследвания на кръвта, за да проследява промените в броя на кръвните клетки или промените в нивата на някои вещества в кръвта ви, напр. захар, масти, холестерол. Децата може да са по-чувствителни от възрастните към нежеланите ефекти като диария, инфекции, намаление на белите и червените кръвни клетки.

CellCept намалява защитните механизми на организма Ви, за да спре отхвърлянето на трансплантирания бъбреck, сърце или черен дроб. Поради това организът Ви няма да може да се бори така добре както обикновено с инфекциите. Ето защо при хора, лекувани със CellCept, може да се появят повече инфекции от обикновено, като инфекции на кожата, устата, стомаха и червата, белите дробове и пикочните пътища. Както може да се случи при



пациенти, употребяващи този вид лекарства, много малък брой от пациентите, получавали CellScept, могат да развият рак на лимфоидните тъкани и кожата.

Обичайните нежелани ефекти, засягащи организма Ви като цяло, може да включват свръхчувствителност (като анафилактични реакции, ангионевротичен оток), повишена температура, летаргия, затруднения на съня, болки (като болка в корема, гръденя кош, ставите/мускулите, болка при уриниране), главоболие, гриппоподобни симптоми и подуване.

Другите нежелани реакции може да включват:

Нарушения на кожата като акне, разязявания на кожата, херпес, задебеляване на кожата, загуба на коса, обрив, сърбеж.

Нарушения на никочните пътища като проблеми с бъбреците или спешни позиви за уриниране.

Нарушения на храносмилателната система и устата като запек, гадене, смущения в храносмилането, възпаление на панкреаса, чревни смущения, включително кървене, възпаление на stomаха, чернодробни проблеми, възпаление на дебелото черво, загуба на апетит, образуване на газове и язви в устата.

Нарушения на нервите и сетивните органи като гърчове, треперене, замайване, депресия, съниливост, изтръпване, мускулни спазми, тревожност, промени в мисленето и настроението.

Обменни, кръвни и съдови нарушения като загуба на тегло, подагра, повишена кръвна захар, кървене, кръвни съсиреци и кръвонасядания, промени в кръвното налягане, нарушения на сърдечния ритъм и разширение на кръвоносните съдове.

Нарушения на белите дробове като пневмония, бронхит, задух, кашлица, течност в белите дробове/гръдената кухина, проблеми със синусите.

Ако някой от нежеланите ефекти стане сериозен или ако по време на лечението ви със CellScept забележите нежелани ефекти, които не са споменати в тази листовка, моля кажете на лекуващия си лекар или фармацевста. Не спирайте обаче приема на лекарството, освен ако първо не сте обсъдили това с лекуващия си лекар.

5. КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВА CELLSEPT

Пазете лекарството на места, където децата не могат да го стигнат и да го видят.



Не използвайте капсулите след датата на изтичане на срока на годност, която е обявена върху картонената кутия (EXP).

Да не се съхранява при температура над 30°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят с водата и отпадъците от домакинството. Попитайте фармацевта как да изхвърлите ненужните лекарства. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа CellCept

- Лекарственото вещество е микофенолат мофетил.
- Другите съставки са:

CellCept капсули:

*модифицирано царевично нишесте,
кроскармелоза натрий,
повидон (K-90),
магнезиев стеарат.*

Капсулна обвивка:

*желатин,
индиго кармин (E132),
жълт желеzen оксид (E172),
червен желеzen оксид (E172),
титаниев диоксид (E171),
черен желеzen оксид (E172),
калиев хидроксид,
шеллак.*

Как изглежда CellCept и съдържание на опаковката

*CellCept 250 mg капсули: 1 картонена кутия съдържа 100 капсули
(в блистерни опаковки по 10 бр.)
1 картонена кутия съдържа 300 капсули
(в блистерни опаковки по 10 бр.)*

Капсули, твърди.

*CellCept капсули са продълговати синьо/кафяви капсули с черен надпис
“CellCept 250” върху капачето на капулата и логото на фирмата върху
мялото на капулата.*



Притежател на разрешението за употреба
Рош България ЕООД, ул."Бяло поле"16, 1618 София, България

Производител, отговорен за освобождаване на партидите
Hoffmann-La Roche AG, Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen, Germany.

За допълнителна информация относно този продукт, моля свържете се с
местния представител на притежателя на разрешението за употреба.

*Подробна информация за този лекарствен продукт се намира на уеб
страницата на Европейската лекарствена агенция (EMEA)
<http://www.emea.eu.int/>*

