

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 18.12.06



Информация за пациента
Tussavit /Тусавит
Сироп за кашлица

Състав

100 g сироп съдържат:

Лекарствени вещества: Thymi folium extr. fluidum (1:1) - 7,53 g.
Plantaginis folium extr. fluidum (1:1), extr. solvent Ethanol 96% - 7,53 g.
Помощни вещества: захар, глицерол, консервант и др.

Лекарствена форма
Сироп

Притежател на разрешението за употреба и производител
Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H, A-6060, Absam/Tirol, Austria

Фармацевтична и терапевтична група и механизъм на действие:
Тусавит сироп облекчава кашлицата, улеснява отхрачването на бронхиалния секрет и дишането, подобрява общото Ви състояние. Тусавит сироп е лекарствен продукт, включващ течни екстракти от листата на Теснолист Живовляя и Машерка, които притежават муколитичен, отхрачващ и спазмолитичен ефекти върху горните дихателни пътища и лигавицата на устната кухина. Течния екстракт от Машерка подпомага втечняването на прилепналата мукос и улеснява отделянето му. Течния екстракт от Живовляя притежава антимикробна активност, противовъзпалително действие и се използва традиционно при лечение на катари на дихателните пътища и възпалителни изменения на мукозните мембрани на устата и фарингса.

Показания

Растителен лекарствен продукт, експекторант; за облекчаване на кашлицата при катари на горните дихателни пътища, простуди, инфекции и възпаление на лигавицата на устната кухина и фаринкса.


Дозировка, начин и продължителност на употреба

Възрастни и деца над 12 год.: 1-2 чаени лъжички /5-10 ml/ до 6 пъти дневно.

Деца 6-12 год.: 1 чаена лъжичка 3-6 пъти дневно.

Деца 2-6 год.: 1 чаена лъжичка 2-3 пъти дневно.

Тусавит сироп е с по-голям ефект ако се приема поне половин час преди или след хранене.



Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките.
Кърмачета и деца под 2 год.

**Бременност и кърмене**

Употребата по време на бременност и кърмене е позволена.

Специални предупреждения

Този лекарствен продукт съдържа малко количество етанол (алкохол) около 0,2 г в една чаена лъжичка и не трябва да се приема от алкохолици. Една чаена лъжичка съдържа също и 2,8 г захароза (захар), това трябва да се вземе в предвид и да не се приема от пациенти с диабет. Ако знаете, че имате нетolerантност към някои видове захари, консултирайте се с лекар преди употребата на този лекарствен продукт.

Предпазни мерки при употреба

При продължаване на оплакванията или ако очаквания резултат не се постига, е необходима лекарска консултация.

Съхранение

Съхранява се на място, недостъпно за деца. Срок на годност след първоначално отваряне на опаковката: 4 седмици. Без специални условия на съхранение.

Взаимодействия

Не са известни досега.

Нежелани реакции

При употребата според указанията, не са известни нежелани реакции. Реакциите на свръхчувствителност не са изключени напълно.

Големина на опаковката

125 g , 250 g

Дата на изтичане срока на годност

Да не се използва след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.

Дата на последна /частична/ редакция на листовката

Декември 2006 година

