

Информация за пациента

Прокто-Гливенол® Супозитории x 10
Procto-Glyvenol® Suppositories x 10

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 30.10.2009

Тази листовка ви предоставя полезна информация за вашето лекарство. Моля, прочетете я внимателно, преди да започнете да го приемате. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към вашия лекар или фармацевт.

1. Какви представлява Прокто-Гливенол?

Всяка супозитория Прокто-Гливенол съдържа като активна съставка 400 mg tribenoside и 40 mg lidocaine base.

Помощи вещества: витепсол Е85, витепсол W 35.

2. Как действа Прокто-Гливенол?

Прокто-Гливенол се използва за лечение на сърбеж, смъдене, оток и болка от вътрешните и външните хемороиди. Подпомага оздравяването.

Tribenoside действа локално върху малките кръвоносни съдове и причинителите на възпалението.

Lidocaine бързо облекчава болката.

3. Преди да използвате Прокто-Гливенол?

Може ли всеки пациент да употребява Прокто-Гливенол?

Не трябва да използвате Прокто-Гливенол, ако сте алергичен към tribenoside, lidocaine или някоя от съставките на продукта.

Ако страдате от тежко чернодробно нарушение, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, преди да прилагате Прокто-Гливенол.

4. Ако сте бременна или кърмите

Не трябва да използвате Прокто-Гливенол през първите три месеца на бременността.

Можете да употребявате Прокто-Гливенол от четвъртия месец на бременността и докато кърмите, но не бива да превишавате препоръчените дози.

5. Какви нежелани ефекти може да предизвика Прокто-Гливенол?

Прокто-Гливенол като цяло се понася добре. Все пак може да предизвика чувство на парене или локално зачервяване на кожата.

Да не се дава на деца без консултация с лекар!

6. Как да използвате Прокто-Гливенол?

Когато симптомите са остри

Прилагайте 1 супозитория два пъти дневно (сутрин и вечер).

Когато симптомите намалеят

Използвайте една супозитория веднъж дневно.

Продължителност на лечението

Използвайте Прокто-Гливенол до пълното изчезване на симптомите.

Ако симптомите продължат повече от една седмица, консултирайте се с вашия лекар.



Не надвищавайте препоръчаната доза.

7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини – няма.

8. Допълнителна информация

Срок на годност

5 години от датата на производство

Не използвайте Прокто-Гливенол след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Условия на съхранение

Да се пази от топлина (съхранявайте при температура под 30 ° C).

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Опаковка

10 супозитории

Производител

Novartis Pharma S.A.S., F-68330 Huningue, France

Последна редакция на листовката

Юли 2005 г.

