

CLOTRIMAZOL

cream

КЛОТРИМАЗОЛ
крем***clotrimazole***

Тази листовка се отнася само за CLOTRIMAZOL крем. Моля прочетете я внимателно преди започване приложението на лекарството. Тя ви информира за най-важното относно CLOTRIMAZOL крем. За повече информация или съвет се обърнете към лекуващия лекар.

И А Л ОДОБРЕНО! ДАТА 25.09.03г.
--

1. Наименование на лекарството

Името на лекарството е Clotrimazol (Клотримазол).

2. Какво представлява и какво съдържа лекарството

Един грам CLOTRIMAZOL крем съдържа 10 mg от лекарственото вещество clotrimazole (клотримазол). Лекарството съдържа също и помощни вещества, необходими за направата на лекарствената форма - сорбитан моностеарат, полисорбат 60, цетацеум, цетостерилов алкохол, 2-октилдодеканол, бензилов алкохол и пречистена вода.

3. Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България

Лекарството се произвежда от GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., с адрес: Grunwaldska Street 189, 60-322 Poznan, Poland. Притежател на разрешението за употреба е Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, UK, представяван в България от GlaxoSmithKline Export Ltd. с адрес: София 1408, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, блок 10.

4. Как действа лекарството

Clotrimazole има широк спектър на антимикотично и антимикробно действие, като потиска развитието и убива дрождоподобните гъбички (по-специално *Candida albicans*), дерматофитите (от родовете *Epidemophyton*, *Microsporum* и *Trichophyton*). Clotrimazole е активен, макар и в по-малка степен и срещу някои Грам-положителни бактерии и протозои (*Trichomonas vaginalis*).

Механизмът на действие на clotrimazole включва промяна на пропускливостта на клетъчните мембрани на чувствителните микроорганизми, водеща до тяхната дестабилизация.

5. За какво се използва CLOTRIMAZOL крем

Clotrimazol крем се използва за локална терапия на кандидозни инфекции на кожата, полулигавицата на срамните устни при жените и главичката на мъжкия полов член.

Лечение на дерматомикози на ръцете, стъпалата, прасците и бедрата.

Лечение на pityriasis versicolor (питириазис верзиколор).

6. Преди да започнете приложението на лекарството

Не прилагайте CLOTRIMAZOL крем:

- ако сте свръхчувствителни (алергични) към clotrimazole или някое от помощните вещества на CLOTRIMAZOL крем.



При поява на кожно дразнене или симптоми на алергични реакции прекратете приложението на лекарството.

7. Бременност и кърмене

При необходимост от лечение на бременни или кърмещи жени следва да се прецени очакваната полза от лечението спрямо всеки възможен риск за плода или детето.

8. Едновременен прием на други лекарства

Непременно уведомете лекаря за всички други лекарства, които приемате в момента, дори за тези, които сте си купили сами без лекарско предписание или препоръка.

Важно е да се има предвид, че clotrimazole може да потисне действието на други, локално действуващи противогъбични продукти, особено полиенови антибиотици – nystatin (нистатин), natamycin (натамицин).

Dexamethasone (дексаметазон) във високи дози потиска противогъбичното действие на clotrimazole.

Противогъбичното действие на clotrimazole се усилва от високи локални концентрации на пропиловия естер на параидроксибензоената киселина.

9. Как да прилагате CLOTRIMAZOL крем

CLOTRIMAZOL крем се нанася с леко втрягане върху поразените участъци от кожата, полулигавицата на срамните устни при жените или главичката на мъжкия полов член. Употребявайте лекарството, както лекуващият лекар ви е препоръчал.

Обично лекарството се прилага 2 до 3 пъти дневно. След изчезване на острите прояви на заболяването, курсът на лечение трябва да продължи поне 4 седмици, до пълното изчезване на симптомите.

10. Какво да направите в случай, че приемете повече от предписаното

Малко вероятно е да възникнат някакви проблеми при предозиране на това лекарство.

11. Нежелани лекарствени реакции

Много рядко при приложението на CLOTRIMAZOL крем могат да се наблюдават нежелани реакции – контактен дерматит, усещане за парене, сърбеж, уртикария, преходно кожно дразнене (папули, зачервяване, оток) или напукване на кожата. При настъпването на тези симптоми трябва да прекратите лечението с CLOTRIMAZOL крем и да уведомите лекуващия ви лекар.

12. Как се съхранява CLOTRIMAZOL крем

Съхранявайте CLOTRIMAZOL крем, както и всяко друго лекарство, на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да не се съхранява при температура под 2°C.

Не приемайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, обозначена върху опаковката.

Запомнете!

Това лекарство е единствено за вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите или подобни на вашите.

Тази листовка не ви дава пълна информация за лекарството.

Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, попитайте лекуващия ви лекар.

Може да ви се наложи да прочетете тази листовка отново, затова не я изхвърляйте, докато употребявате лекарството.

Дата на последна редакция: 21.08.2001

