

ЛИСТОВКА-ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ЛОРАТАДИН УНИФАРМ таблетки 10 мг

LORATADIN UNIPHARM tablets 10 mg

Лоратадин (loratadine)

И А Л
ОДОБРЕНО!
ДАТА 05.12.08г.

- Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете лечение. Тя съдържа кратка информация относно Вашето лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате никакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

- Какво представлява LORATADIN UNIPHARM и за какво се използва
- Преди да приемете LORATADIN UNIPHARM
- Как да приемате LORATADIN UNIPHARM
- Възможни нежелани ефекти
- Съхранение на LORATADIN UNIPHARM
- Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LORATADIN И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

LORATADIN UNIPHARM е лекарство от групата на антихистамините с продължително действие, които се използват за лечение на алергични реакции. Той избирателно блокира периферните H₁-рецептори (в кожата и лигавиците), с които се свързва хистамин (вещество, което се образува в организма при алергии). В резултат на това се появяват алергични реакции, които се изразяват със сърбеж, кихане, сълзене от очите, оток, кожни обриви и други признания на алрегистията. LORATADIN UNIPHARM практически не оказва потискащо (седативно) действие върху централната нервна система.

LORATADIN UNIPHARM е показан за облекчаване на симптомите на сезонен и целогодишен ринит (сърбеж на носа, кихане и отделяне на воднист секрет), алергичен конюнктивит (сърбеж, парене и зачервяване на очите) и хронична идиопатична уртикария (сърбеж, зачервяване и оток на кожата).

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ LORATADIN UNIPHARM**Не трябва да се приема LORATADIN UNIPHARM:**

- Ако сте алергични (с повишена чувствителност) към лекарственото вещество лоратадин или някое от помощните вещества на продукта;
- При деца под 2 годишна възраст.

Предупредете лекуващия лекар ако:

Уведомете лекуващия лекар, ако имате чернодробно или бъбречно заболяване. При предстоящо провеждане на тестове за алергия, трябва да прекратите лечението с LORATADIN UNIPHARM 4-7 дни преди тестването, тъй като е възможно да се получи фалшиво отрицателен резултат.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар ако приемате или накърно сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт.

При едновременното приложение на лоратадин с еритромицин (антибиотик), циметидин и кетоконазол (противогъбичково средство) не са наблюдавани клинично значими нежелани лекарствени реакции, но въпреки това е необходимо да се избягва едновременното им приложение.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство, ако сте бременна или планирате да забременеете.

Приемането на LORATADIN UNIPHARM по време на бременност е възможно само в случаите на сериозни медицински показания за това. Необходимо е да се избягва приложението му по време на кърмене, тъй като лекарственото вещество се екскретира в кърмата и може да достигне концентрации, еквивалентни на плаズмените.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

По време на клинични проучвания не е установено нарушение на способността за шофиране. Въпреки това, макар и рядко, е възможна появата на съниливост, която може да повлияе неблагоприятно способността Ви за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на LORATADIN UNIPHARM

Лекарственият продукт съдържа лактоза. Неподходящ е при хора с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ LORATADIN UNIPHARM?

Винаги прилагайте LORATADIN UNIPHARM както Ви е препоръчал лекуващия лекар. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

LORATADIN таблетки се приема през устата с вода.

Възрастни и деца над 12-годишна възраст - по 1 таблетка дневно. Дозата може да бъде разделена на 2 приема – по 1/2 таблетка сутрин и вечер.

Деца от 6 до 12-годишна възраст – по 1/2 таблетка дневно. Максимална дневна доза – 1 таблетка.

Деца от 2 до 6-годишна възраст - Препоръчва се употребата на сиропна лекарствена форма.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече таблетки LORATADIN UNIPHARM от необходимото

В случай, че сте приели по-висока от предписаната доза, може да се появи съниливост, световъртеж, гадене, повръщане. При деца приема на по-висока от предписаната доза може да предизвика спазъм на мускулите, треперене, сърдебиене, възбуда.

При предозиране потърсете лекарска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете LORATADIN UNIPHARM

Ако пропуснете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Продължете да вземате лекарството, както Ви е предписано.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, LORATADIN UNIPHARM може да има нежелани ефекти. Те обаче не се наблюдават задължително при всички пациенти, така че Вие можете да не получите никаква реакция.

По време на лечението с LORATADIN UNIPHARM е възможно, макар и рядко, да се наблюдават следните нежелани лекарствени реакции: главоболие, съниливост, уморяемост, сухота в устата, гадене, повишен апетит, стомашно-чревен дискомфорт и реакции на свръхчувствителност.

При деца прилагането на LORATADIN UNIPHARM много рядко може да предизвика нервност, свиркащо дишане, уморяемост, хиперкинезия (неволни движения), коремни болки, конюнктивит, дисфония (дрезгав или пресипнал глас), общо неразположение.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА LORATADIN UNIPHARM

Съхранявайте лекарството в оригиналната опаковка, на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C!

Съхранявайте лекарството на сигурно място, където децата не могат да го видят и достигнат.

Лекарството не трябва да се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Създайте си навик да връщате неизползваните или стари лекарства на Вашия фармацевт.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа LORATADIN UNIPHARM?

Всяка таблетка съдържа лекарствено вещество лоратадин (*loratadine*) 10 мг.

Другите съставки са лактозаmonoхидрат, царевично нишесте, микрокристална целулоза, колоидален силициев диоксид, повидон, магнезиев стеарат.

Как изглежда LORATADIN UNIPHARM и какво съдържа опаковката

Таблетки – кръгли, плоски, бели, с фасета и делителна черта. По 10 таблетки се опаковат в блистер от ПВХ и алуминиево фолио, по 1 или 3 блистера заедно с листовка в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

УНИФАРМ АД, България

1756 София, ул. "Пр. Станоев" 3

Последна редакция на текста: 28.09.2006 г.

