

**Информация за пациентта**

*Прочетете внимателно преди употреба.*

**Metoprolol Valeant**  
**Метопролол Валеант**

(*Metoprolol tartrate*)  
 таблетки 50 mg

**СЪДЪРЖАНИЕ**

1 таблетка съдържа 50 mg Metoprolol tartrate

Помощни вещества: микрокристална целулоза, картофено нишесте, натриев глюколат на скорбяла, поливинил пиролидон, талк, магнезиев стеарат.

**ОПИСАНИЕ**

Метопролол е средство, което блокира бета-адренорецепторите, потиска нервната проводимост в различни органи на тялото, намалява сърдечния обем, понижава нуждите от кръв и кислород и стабилизира сърдечния ритъм.

**ПОКАЗАНИЯ**

- Повищено кръвно налягане, ангина пекторис (стенокардия)
- Аритмии
- Инфаркт на миокарда, профилактика на мигрена
- Като помощно лекарство при лечението на хипертиреоидизъм

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

- Втора или трета степен атриовентрикуларен блок
- Кардиогенен шок
- Значителна брадикардия (забавяне на ритъма на сърдечната дейност)
- Декомпенсирана миокардна недостатъчност
- Синусов синдром
- Свръхчувствителност към метопролол и други бета-адренолитици.
- Някои сериозни поражения на периферните съдове
- Някои видове инфаркти на миокарда.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

- Не трябва да прекъсвате лечението без лекарска консултация. Ако се налага прекъсване на лечението, това трябва да стане постепенно при строг лекарски контрол.

Внезапното прекъсване на лечението може да доведе до сериозно влошаване на заболяването, включително и инфаркт на миокарда.

Ето защо, трябва винаги, особено през почивните дни, да имате достатъчен резерв от лекарството или допълнителна рецепта.

- Преди лечението трябва да информирате Вашия лекар или лекар по дентална медицина за установена алергия към бета-адренолитични лекарства и други алергии, напр. към храна и козметични продукти. Лечението с Метопролол може да засили алергичните реакции. Ако се появят сериозни алергични реакции, Вие трябва да повикате бърза помощ незабавно и да информирате лекаря, *че приемате Метопролол.*

- Поради възможно засилване на симптомите и влошаване на *некотори заболявания* преди да започнете лечение с Метопролол, Вие трябва да информирате *Вашия лекар* за следните заболявания:

- бронхит, емфизем, алергични заболявания, като астма, сенна хрема, лекарството



- може да засили затрудненията в дишането),
- сърдечносъдови заболявания (лекарството може да влоши някои сърдечни нарушения, напр. брадикардия)
  - диабет (лекарството може да маскира някои симптоми в резултат на ниско ниво на кръвната захар след прием на някои антидиабетни средства, напр. тахикардия)
  - чернодробна дисфункция (отделянето на лекарството от организма може да се забави)
  - подагра (лекарството причинява влошаване на заболяването)
  - хипертриеоидизъм (Метопролол може да маскира някои симптоми на хипертриеоидизъм, като тахикардия. Внезапното спиране на лекарството може да засили симптомите на заболяването.)
  - Ако се налага операция (включително челюстна хирургия), Вие трябва да информирате Вашия лекар или лекар по дентална медицина, че приемате Метопролол
  - Сърдечната честота трябва се проследява редовно по време на лечение и при всеки медицински преглед. Ако сърдечната честота стане по-ниска от обичайното или по-малко от 50 удара в минута, незабавно повикайте Бърза помощ, защото прекомерното забавяне на пулса може да причини сериозни сърдечносъдови увреждания.
  - Поради високото кръвно налягане, пациентите, приемащи Метопролол трябва да спазват предписаната от лекаря диета, и особено да избягват богати на натрий храни. Метопролол не лекува високото кръвно налягане, а само помага за стабилизирането му. Ето защо, лекарството трябва да се приема точно, както е предписано, дори и по време на лечението кръвното налягане да се стабилизира и да настъпи цялостно подобрене на състоянието на пациента.
  - Трябва стриктно да спазвате графика за медицинските прегледи. Това ще даде възможност на Вашия лекар да проследи резултата от лечението и да направи корекции.
  - Не трябва да приемате едновременно други лекарства без лекарска консултация. Това се отнася особено много за лекарства, които можете да закупите без лекарско предписание, като тези, използвани за простудни заболявания.
  - По време на лечението трябва да се обличате подходящо, защото Метопролол може да повиши чувствителността на кожата към слънчевите лъчи.

#### Употреба при деца и пациенти в напредната възраст.

Метопролол не се препоръчва при деца.

Само лекарят решава, дали да назначи терапия или не.

Няма специални предписания за пациенти в напредната възраст, освен ако те не страдат от бъбречно или чернодробно заболяване.

#### Употреба при бременност и кърмене

Метопролол не трябва да се прилага по време на бременност и кърмене.

Преди лечението трябва да информирате Вашия лекар за съществуваща или потенциална бременност.

Лекарството може да се приема, само когато потенциалната полза за майката оправдава евентуалния риск за плода или новороденото.

#### Ефект на лекарството върху способността за шофиране и работа с машини и върху психомоторните функции.

През ранната фаза на лечението с Метопролол пациентът не трябва да управявай автомобили, да работи с машини или да упражнява дейност, изискваща продължителна концентрация, докато не настъпи подобряване на състоянието му. През това време трябва да се внимава, защото приемът на лекарството може доведе до съниливост и замъглено зрение.



## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Метопролол може да взаимодействува с много други лекарства и това може да промени действието, както на Метопролола, така и на другите лекарства или да причини сериозни нежелани реакции. Поради това, трябва да информирате Вашия лекар за всички други лекарства, които приемате. Това се отнася особено за продуктите, съдържащи следните вещества, които не трябва да се приемат едновременно с Метопролол.

- Средства, блокиращи бавните калциеви канали: верапамил, дилтиазем, фелодипин, исрадипин, нитрендипин;
- Анти-аритмични средства;
- Общи анестетици;
- Орални антидиабетични средства и инсулин;
- Инхибитори на моноаминооксидазата (МАО), като селегелин или фуразолидон;
- Поради евентуална възможност от внезапно повишаване на кръвното налягане, ако се наложи прекъсване на лечението с Метопролол и други антихипертензивни средства с централно действие (напр. клонидин или моноксдин), метопролол трябва да се спре няколко дни преди да се прекъсне лечението с другите лекарства.
- Лекарствата, повлияващи чернодробната функция, като рифампицин, фенобарбитал или циметидин, както и пероралните контрацептиви могат да променят концентрацията на Метопролол в кръвта и да намалят неговия ефект.
- Някои противовъзпалителни средства, като индометацин, ибупрофен, пиroxикам може да намалят ефекта на Метопролол за понижаване на кръвното налягане.

## **ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

### **Възрастни:**

Дозата трябва да се определя индивидуално.

Обикновено се прилага следната схема:

#### ***Високо кръвно налягане:***

Дневната доза на Метопролол е 100 до 450 mg.

Препоръчителната доза трябва да се взима веднъж дневно (сутрин) или, в случай на недостатъчен контрол на кръвното налягане – два пъти дневно в две разделни дози. Първоначалната дневна доза е 100 mg. В зависимост от състоянието на пациента и при строг медицински контрол, дозата може да се увеличава със 100 mg дневно през интервал от една седмица.

#### ***Ангина пекторис:***

Дозата трябва да се определя индивидуално.

Обикновено, първоначалната дневна доза е 100 mg, назначена в две разделни дози от 50 mg всяка. Ако се налага, дозата може да се увеличава постепенно през интервал от една седмица до 50-100 mg, приемани два или три пъти дневно.

#### ***Аритмия:***

50 mg два или три пъти дневно. Ако е необходимо, дозата може да се увеличи до 200 – 300 mg дневно, приемани в разделни дози.

#### ***Инфаркт на миокарда:***

Дозата и начина на приемане се определят от лекаря.

Профилактика на мигрена.

100 -200 mg дневно в разделни дози.

***Хипертиреоидизъм (прекомерно образуване на тиреоидни хормони, всл. на увеличена функция на щитовидната жлеза)***



50 mg 4 пъти дневно. След стабилизиране, дозата трябва да се намали под лекарски контрол.

*Деца:*

Ефективността и безопасността на Метопролол при деца не са установени.

*Дозировка при пациенти с нарушенна бъбречна функция и пациенти в напредната възраст.*

Не е необходимо приспособяване на дозата при пациенти с нарушенна бъбречна функция, нито пък при пациенти в напредната възраст.

*Нарушене на чернодробната функция:*

Тъй като Метопролол се метаболизира интензивно с черния дроб, при пациентите с нарушенна чернодробна функция дозата трябва да бъде пригодена от лекар.

*Приложение:*

Когато се прилага орално, Метопролол трябва да се взема по време на ядене или непосредствено след това.

*Продължителност на лечението:*

Продължителността на лечението се определя от лекаря.

*Действия в случай на приемане на по-малка доза или пропускане на доза.*

Трябва да помните, че е необходимо редовно да приемате лекарството. Това е особено важно, ако лекарството е назначено в една дневна доза. Нередовното приложение може да доведе до влошаване на състоянието на пациента.

Ако е пропусната доза, тя трябва да се приеме възможно най-скоро. Ако остават приблизително 4 часа до следващата предписана доза според схемата на приемане, трябва да пропуснете забравената доза и да се придържате към първоначалната схема. Не трябва да удвоявате дозата.

### **ПРЕДОЗИРАНЕ**

В случай на предозиране, незабавно трябва да повикате Бърза помощ. Ако предозирането е станало малко преди да се предприеме лечение, трябва да се изпразни стомаха, като се предизвика повръщане, последвано от промивка, а след това да се приеме активен въглен. Последващото лечение трябва да бъде назначено от лекар.

### **НЕЖЕЛЯНИ РЕАКЦИИ**

Нежеланите реакции са редки и обикновено умерени. Най-често се съобщава за лесна уморяемост, стомашночревни нарушения (гадене, повръщане и болка в корема) и безсъние. В повечето случаи те са преходни и изчезват след намаляване на дозата.

Въпреки това, незабавно се свържете с лекар, ако се появят някои от следните симптоми: изразено забавяне на сърдечната честота (под 50 удара в минута), неравномерен пулс, болка в гърдите, продължаваща повече от 15 минути, затруднено дишане, оток на глезните, прасците или ходилата, сърбези.

Посъветвайте се с Вашия лекар и когато се появят някои малки симптоми, като замаяност, сънливост, отпадналост, депресия, нарушения на съня, ноими кошмари, студени ръце и крака. Рядко се съобщава за свръхчувствителност към сълънчевите лъчи, увеличено изпотяване, косопад, отслабване, замъглено зрение, конюнктивит, тинитус (звънене в ушите), сухота в устата и раздразнени очи.



Алкохолът утежнява нежеланите реакции.

#### СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява в оригинална опаковка при температура под 25°C. Да се пази от достъп на деца. Да не се използва след изтичане на срока на годност.

#### КАК СЕ ПРЕДОСТАВЯ

Метопролол Валеант таблетки 50 mg са опаковани в кутии от 30 и 40 таблетки.

#### ИМЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ICN Polfa Rzeszow S.A.,  
35 959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2  
Polska

ТАЗИ ЛИСТОВКА Е АКТУАЛИЗИРАНА НА:

Февруари 2006

