


Информация за пациента
Моля, прочетете внимателно преди употреба!

Iberogast® - Иберогаст
Перорални капки, разтвор



Какво представлява Иберогаст?

Лекарство на растителна основа за стомашно-чревни заболявания

За какво се използва Иберогаст?

За лечение на функционални и свързани с мотилитета стомашно-чревни заболявания като синдром на нервния стомах и раздразнено дебело черво, включително смущения, наподобяващи спазми на стомашно-чревния тракт (стомашно-чревни спазми), както и за поддържащо лечение на оплакванията при възпаление на стомашната лигавица (гастрит).

Кога не трябва да използвате Иберогаст?

Да не се приема при известна свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Какво трябва да имате предвид ако сте бременна или кърмите?

Досегашните данни не са показвали неблагоприятно влияние при употребата на лекарството по време на бременност и кърмене. Въпреки това, по време на бременност и кърмене, Иберогаст трябва да се приема само след консултация с лекар.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употребата на Иберогаст?

Ако симптомите продължават или състоянието се влоши, трябва да спрете приема на Иберогаст и да потърсите лекарска помощ.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Иберогаст или могат да бъдат повлияни?

Засега не са известни никакви взаимодействия с други лекарства или хани.

Как можете да използвате Иберогаст и колко дълго?

Ако няма друго предписание, Иберогаст се приема с малко течност преди или по време на хранене по следния начин:



Възрастни и деца над 12 години	3 пъти дневно по 20 капки
Деца на възраст от 6 до 12 години	3 пъти дневно по 15 капки
Деца на възраст от 3 до 6 години	3 пъти дневно по 10 капки

Няма принципно ограничение на продължителността на приложение. Продължителността на приема се определя от вида, тежестта и протичането на заболяването.

Да се разклати преди употреба!

Какво трябва да предприемете ако сте приели по-голямо количество или сте забравили да приемете Иберогаст?

В случай, че сте погълнали Иберогаст в големи количества или сте забравили прием, по време на следващия прием продължете според предписанието на лекаря или както е дадено в упътването за дозиране.

Досега няма данни за остра реакция при предозиране.

Какви нежелани лекарствени реакции може да предизвика Иберогаст?

Много рядко може да се появят реакции на свръхчувствителност като обрив, сърбезки, дихателни затруднения.

При появя на нежелани лекарствени реакции преустановете приема на Иберогаст и потърсете помощта на Вашия лекар. Той ще прецени тежестта им и какви мерки евентуално трябва да се предприемат.

Указание:

Ако забележите нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка, моля съобщете това на лекар или фармацевт.

Как да съхранявате Иберогаст?

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Предупреждение:

Ако в Иберогаст се образуват парцали или утайки, те не оказват влияние върху действието на продукта.

Срок на годност:

Срокът на годност е 24 месеца.

Срок на годност след първоначално отваряне на опаковката - 8 седмици

Иберогаст не бива да се използва след изтичане на срока на годност, отбелаязан върху опаковката.



Състав:

100 мл разтвор съдържа:

Активни вещества:

Iberidis amarae herba recens extractum fluidum (1 : 1,5 - 2,5), extr. solvent Ethanol 50% (v/v)	15,0 мл
Angelicae radix et rhizoma extractum fluidum (1 : 2,5 - 3,5), extr. solvent Ethanol 30% (v/v)	10,0 мл
Matricariae flos extractum fluidum (1 : 2 - 4), extr. solvent Ethanol 30% (v/v)	20,0 мл
Carvi fructus extractum fluidum (1 : 2,5 - 3,5), extr. solvent Ethanol 30% (v/v)	10,0 мл
Silybum marianii fructus extractum fluidum (1 : 2,5 - 3,5), extr. solvent Ethanol 30% (v/v)	10,0 мл
Melissae folii extractum fluidum (1 : 2,5 - 3,5), extr. solvent Ethanol 30% (v/v)	10,0 мл
Menthae piperitae folii extractum fluidum (1 : 2,5 - 3,5), extr. solvent Ethanol 30% (v/v)	5,0 мл
Chelidonii herba extractum fluidum (1 : 2,5 - 3,5), extr. solvent Ethanol 30% (v/v)	10,0 мл
Liquiritiae radix extractum fluidum (1 : 2,5 - 3,5), extr. solvent Ethanol 30% (v/v)	10,0 мл

Съдържа 31 об.% алкохол.

1 мл разтвор съдържа 20 капки

Лекарствена форма и съдържание

Перорални капки, разтвор в тъмна стъклена бутилка с апликатор-капкомер и капачка на винт от PE.

Оригинална опаковка от 20 мл

Оригинална опаковка от 50 мл

Оригинална опаковка от 100 мл

Производител и притежател на разрешението за употреба:

S T E I G E R W A L D

Arzneimittelwerk GmbH

Havelstraße 5

64295 Darmstadt, Germany

Медицинско представителство в България: Либра АД

Дата на актуализиране на текста

Ноември 2006 г.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Иберогаст® съдържа по-малко от 0,1 хлебни единици на 20 капки.

