


Преди употреба на Цинаризин-Фарма, моля прочетете внимателно листовката, тъй като тя съдържа важна информация, която трябва да имате предвид при употребата на лекарството.



Указания за употреба

Cinnarizin –Pharma tablets 25 mg

Цинаризин – Фарма таблетки 25 мг

Наименование на лекарствения продукт

Cinnarizin – Pharma (Цинаризин - Фарма)

Какво съдържа Вашето лекарство?

Всяка таблетка Цинаризин–Фарма съдържа лекарствено вещество 25 mg Cinnarizine (цинаризин).

Лекарството съдържа като помощни вещества: Лактоза монохидрат, Пшеничено нишесте, Силициев диоксид колоиден безводен, Магнезиев стеарат, Повидон К 25 и Талк.

Лекарствена форма и Фармако-терапевтична група

Цинаризин–Фарма под формата на таблетки принадлежи към групата на антивертигенозните средства и подобрява мозъчното кръвообращение.



Защо използвате това лекарство?

Цинаризин-Фарма е предназначен за:

поддържащо лечение при симптоми на лабиринтни нарушения, като световъртеж, тинитус, нистагъм, гадене и повръщане.

Профилактика на кинетози.

Как да приемате Вашето лекарство?

Цинаризин-Фарма таблетки 25 mg е предназначен за възрастни.

При лабиринтни нарушения се приема от 1 таблетка 3 пъти дневно.

Кинетози: 1 таблетка половин час преди пътуване, като при необходимост дозата може да се повтори на всеки 6 часа.

Максималната дневна доза е 6 таблетки.

Начин на приложение:

Таблетките се приемат през устата с достатъчно количество вода (напр. чаша вода), по време или веднага след хранене.

Внимание! Кога не трябва да се употребява това лекарство?

Цинаризин-Фарма не трябва да се употребява в следните случаи:

- Ако сте свръхчувствителен към лекарственото вещество и/или някое от помощните вещества на продукта.
- Ако страдате от моторни нарушения (нарушения на движението), при наличие на тремор (треперене) или екстрапирамидални нарушения (заболявания с множество изяви на централната нервна система) и болестта на Паркинсон ;



- Ако страдате от депресия (подтиснатост), закритоъгълна глаукома (увеличено вътреочно налягане), задръжка на урината свързана с уретропростатни нарушения (нарушения в уринирането).
- Ако страдате от артериална хипотония (намалено кръвно налягане).

Специални предупреждения при употреба

- В началото на лечението при отделни пациенти може да се наблюдава засилване на лечебния (терапевтичен) ефект на продукта, което да се изрази със замаяност и понижаване на кръвното налягане.
- Имайте в предвид, че при пациенти в старческа възраст може да доведе до хроничен запек с риск от развитие на паралитичен илеус (непроходимост на тънките черва), както и да засили проявите (симптоматиката) при хипертрофия на простата (увеличение на простатната жлеза).
- При тежка чернодробна и/или бъбречна недостатъчност съществува повишен риск от кумулация (натрупване) на лекарствения продукт.

На какво трябва да се обърне внимание при бременност и кърмене?

Бременност: Препоръчително е да избягвате приемането на Цинаризин–Фарма по време на бременността. Ако разберете, че сте бременна докато приемате лекарството, консултирайте се със своя лекар, който единствен може

Кърмене: По време на кърмене приемането на Цинаризин–Фарма трябва да се избягва.



Какво е влиянието на лекарството върху способността за шофиране и работа с машини?

При отделни пациенти Цинаризин може да окаже влияние върху активното внимание и рефлексите и поради това трябва да се прилага с особено внимание при водачи на моторни превозни средства, работещи на високо и с машини поради забавяне на реакциите особено в началото на лечението.

Важна информация за някои съставки на Цинаризин-Фарма

Това лекарство съдържа лактоза и пшенично нишесте.

Лактозата може да представлява опасност за хора с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция (нарушение в разграждането и усвояването на веществата в тънките черва).

Пшеничното нишесте, което може да представлява опасност за хора с глутенова ентеропатия (непоносимост към глутен).

Какви взаимодействия може да има между Цинаризин-Фарма и други лекарства, с които се лекувате?

Необходимо е внимание при едновременно приемане на Цинаризин-Фарма и лекарства от следните групи:

- Обезболяващите средства, сънотворните, средствата за анестезия, алкохола, поради възможността Цинаризина да засили потискащото им действие върху централната нервна система (ЦНС).
- Цинаризинът като средство с антихистаминово действие може да повиши седативния (успокояващ) ефект на следните депресанти (подтискащи) средства на ЦНС като: алкохол, барбитурати (фенобарбитал), хипнотици



(сънотворни), опиевидни аналгетици (кодеин), анксиолитици и невролептици (диазепам).

- Не са наблюдавани нежелани взаимодействия, когато цинаризинът се приема едновременно с антихипертензивни (понижаващи кръвното налягане средства), диуретици (отводняващи средства), антикоагуланти (противосъсирващи средства) или хипогликемични лекарства (намаляващи нивото на кръвната захар).
- С атропин и други антихолинергични (спазмолитични болкоуспокояващи) средства може да се очаква адитивен (допълващ) ефект.
- Ако Ви предстои провеждането на тест за определяне на кожна реактивност, спрете приема на лекарствения продукт 4 дни преди изследването, поради опасност от фалшиво-отрицателен резултат.

Какви нежелани лекарствени реакции могат да настъпят при прилагането на Цинаризин Фарма?

Лекарството, като правило, се приема добре от пациентите. Но както всяко друго лекарство, Цинаризин-Фарма в отделни случаи може да предизвика нежелани лекарствени ефекти с различна тежест при някои пациенти:

- В началото на лечението може да се появят сънливост, замаяност, неприятни усещания в коремната област. Тези признаци не изискват спиране на лечението.
- Рядко могат да се наблюдават кожни обриви, сърбеж, сънливост, гадене и повръщане, безсъние, депресия, сухост в устата.
- При продължително лечение и при пациенти в напреднала възраст Цинаризин може да предизвика нарушения в двигателната активност, в отделни случаи поява на треперене, повишен мускулен тонус.



- При продължително лечение с лекарствения продукт съществува риск от повишаване на телесното тегло.

В такива и всички други случаи, включително и неописани в указаниято, е необходима незабавна консултация с Вашият лекар.

Какво да предприемете ако сте приели повече Цинаризин-Фарма отколкото трябва?

В случай, че по невнимание приемете значително по-висока доза от предписаната и се появят признаци на сънливост, повръщане, мускулна слабост, треперене, е необходимо незабавно да потърсите лекарска помощ.

Какво да предприемете, ако сте забравили да приемете Цинаризин-Фарма?

Не приемайте двойна доза, за да наваксате пропуснатата. Приемете следващата доза в обичайното за това време.

Как трябва да съхранявате Цинаризин-Фарма?

- Да се съхранява при температура под 25°C!
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
- Да се пази от светлина и влага!

Срок на годност

- Срокът на годност е отбелязан посочен върху картонената опаковка и блистера.
- При правилно съхранение срокът на годност е 3 години от датата на производство.
- Цинаризин-Фарма не трябва да се използва след изтичане срока на годност.



Начин на отпускане

Отпуска се без лекарско предписание.

Регистрационен номер

20010055

Данни за опаковката

- Таблетките се опаковат в блистери от твърдо PVC фолио и алуминиево фолио.
- Таблетки по 25 mg по 50 броя в една опаковка (1 брой блистер).
- Таблетки по 25 mg по 100 броя в една опаковка (2 броя блистера).
- Таблетки по 25 mg по 2000 броя в една опаковка за Болнична употреба (40 броя блистера)

Последна редакция на текста

Декември 2006 г..

Производител и притежател на разрешението за употреба

Цинаризин се произвежда от :

“ФАРМА“ АД

ул. Неофит Рилски 13

2600, гр. Дупница.

тел.: /0701/50286,87,88

факс: 0701 /50290

E-mail: pharma-dup@infotel.bg

