

CALGEL™ (КАЛГЕЛ)

Обезболяващ гел за венци при никнене на зъбки

*lignocaine hydrochloride
cetylpyridinium chloride*

ИАЛ
ОДОБРено!
ДАТА 13.03.07

Тази листовка се отнася само за CALGEL. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приложение на лекарството. Тя ви информира за най-важното относно продукта. За повече информация или съвет се обърнете към лекар или фармацевт!

Наименование на лекарството

Името на лекарството е CALGEL.

Какво представлява и какво съдържа CALGEL

CALGEL е гел за венци. Опакован е в туба от 10 грама.

CALGEL съдържа лекарствените вещества *lignocaine hydrochloride* (лигнокайн хидрохлорид) - 0,33% w/w и *cetylpyridinium chloride* (цетилпиридиниум хлорид) - 0,1% w/w в бистра, жълтоцветена, водноразтворима, беззахарна основа. CALGEL съдържа и следните помощни вещества: сорбитолов разтвор, ксилитол, глицерол, хидроксиетилцелулоза, макрогол, карамел, етанол, хидрогенизирано рициново масло, натриев захарин, хидроксиполиетоксидодекан, левоментол, есенция, пречистена вода.

Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България

CALGEL се произвежда от GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., 189 Grunwaldzka Street, 60-322 Poznan, Poland. Притежател на разрешението за употребата му е ГлаксоСмитКайн ЕООД, ул. Димитър Манов, бл.10, 1408 София, България.

За какво се използва CALGEL

CALGEL се прилага при кърмачета в периода на никнене на зъбки. CALGEL бързо облекчава болката, предизвикана от поникването на зъбки и успокоява венеца. CALGEL притежава и антисептично действие.

Как да прилагате CALGEL

Малко количество - около 7-8 mm лентичка от гела се изстисква върху върха на пръста или върху памучна кърпичка и внимателно се нанася върху зачервената част на венеца.

При необходимост това се повтаря след интервал не по-малък от 20 минути. Не трябва да се правят повече от 6 апликации дневно. CALGEL е подходящ за деца над тримесечна възраст.

Какво трябва да имате предвид преди да започнете приложение на продукта

Противопоказания

CALGEL не трябва да се прилага при деца, които са алергични към продукта или някоя от неговите съставки.

Предупреждения

Препоръчаната доза не трябва да се надвишава. В случай на появя на нежелани реакции или при предозиране, преустановете приложението на гела и се консултирайте с лекар.

Причинява ли CALGEL нежелани лекарствени реакции

Когато CALGEL се прилага правилно, не се очакват нежелани реакции. В редки случаи може да се наблюдава проява на свръхчувствителност (алергия) към продукта.

Как се съхранява лекарството

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се използва след изтичане на срока на годност, означен върху опаковката.

CALGEL се отпуска без лекарско предписание.

CALGEL е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

Може да ви се наложи да прочетете тази листовка отново, затова не я изхвърляйте, докато не употребите или изхвърлите лекарството в опаковката.

Дата на последна редакция: Септември 2006

