

Прочетете внимателно цялата листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация.
Този лекарствен продукт може да се закупува без лекарско предписание, така че да можете сами да лекувате някои заболявания. Въпреки това, Вие все пак трябва внимателно да използвате APAP Extra, за да имате най-добри резултати от лечението.
Пазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от съвет, моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
Ако симптомите Ви се задълбочат или състоянието Ви не се подобрява след няколко дни, трябва да се свържете лекар.

APAP Extra / АПАП Екстра

(Paracetamol + Coffein)

(500 mg + 65 mg)

Съдържание:

1 филмирана таблетка съдържа:

активни вещества:

paracetamol

500 mg

caffeine

65 mg

помоицни вещества: поливинилпиролидон, дестилирана вода, царевично нишесте, метилсалицилат, талк, калцийев стеарат.

обвивката на таблетките съдържа: хидроксипропил метилцелулоза, полиетилен гликол

Предлагани опаковки:

6 таблетки в един блистер, в картонена опаковка

10 таблетки в един блистер, в картонена опаковка

12 таблетки в един блистер, в картонена опаковка

24 таблетки в 2 блистера по 12 таблетки, в картонена опаковка

24 таблетки в 4 блистера по 6 таблетки, в картонена опаковка

Притежател на разрешението за употреба:

US Pharmacia Sp. z. o.o.

Zięcka 40, 50-507 Wrocław, Poland

В тази листовка:

1. Какво представлява APAP Extra и за какво се използва
2. Преди да използвате APAP Extra
3. Как се приема APAP Extra
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на APAP Extra
6. Допълнителна информация за APAP Extra



1. Какво представлява АРАР Extra и за какво се използва?

АРАР Extra е аналгетичен и антипиретичен лекарствен продукт. Съдържа парацетамол и кофеин. Кофеинът увеличава силата на аналгетичното действие на парацетамола. Освен това, кофеинът има стимулиращо действие върху централната нервна система, като подобрява общото физическо състояние и гловлиява умората.

АРАР Extra се използва за временно понижаване на температурата и облекчаване на болката.

Показанията за употреба на този лекарствен продукт са: леки до умерени болки от различен произход: главоболие; включително мигрена, мускулни болки, зъббол, болезнена менструация, костни и ставни боляки, постоперативни и посттравматични болки. Този лекарствен продукт облекчава симптомите на обикновена настинка и грип, като: повишена температура, болки в гърлото, мускулни, костни и ставни болки.

2. Преди да използвате АРАР Extra

Не приемайте това лекарство ако:

- в миналото сте имали симптоми на алергия към някоя от съставките на този продукт.
- имате някое от следните заболявания: метхемоглобинредуктазна недостатъчност, алкохолизъм, тежка чернодробна или бъбречна недостатъчност, сърдечна аритмия, вродена глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност и
- по време на лечение с инхибитори на моноаминооксидазата и 2 седмици след спирането им.
- По време на лечение със зидовудин (zidovudine).
- Да не се употребява при жени през първия триместър от бременността и в периода на кърмене.
- Да не се употребява при деца под 12 години.

Внимавайте особено много с АРАР Extra:

- Пациенти с чернодробна недостатъчност, хора, които злоупотребяват с алкохол и не се хранят пълноценно са изложени на рисък от чернодробно увреждане, когато приемат този продукт.
- Да се употребява внимателно при пациенти с чернодробна недостатъчност, бронхиална астма, хипертиреоидизъм (прекомерно образуване на тиреоидни хормони, вследствие на увеличена функция на щитовидната жлеза) и нарушения в съня, които се изразяват в безсъние.
- По време на лечение с това лекарство не се позволява да се консумира алкохол, поради повышен рисък от чернодробно увреждане.
- Рискът от чернодробно увреждане е особено голям при хора, които се хранят непълноценно и редовно приемат алкохол.

Използване на това лекарство с храна и напитки.

Храната не намалява резорбцията на лекарството.

Бременност

Да не се използва през първия триместър на бременността в периода на кърмене. През втория и третия триместър трябва да се консултирате с Вашия лекар, преди да вземете това лекарство.

Кърмене

Да не се използва в периода на кърмене.

Употреба на други лекарствени продукти:

Това лекарство не трябва да се взема едновременно с други лекарствени продукти, съдържащи парацетамол и кофеин. В случай на едновременно лечение с орални антидиабетични средства, антикоагуланти (варфарин, кумарин), рифампицин, антиепилептици, седативни и сънотворни средства, инхибитори на моноаминооксидазата, зидовудин, симпатикомиметици, тироидни хормони, орални контрацептиви, симетидин, хидрохинони и верапамил, помолете Вашия лекар за съвет, преди да започнете употреба на това лекарство.

3. Как се приема АРАР Extra

Възрастни и деца над 12 години:

1-2 таблетки на всеки 4-6 часа, (максимум 8 таблетки дневно).

Да не се дава на деца под 12 години.



Ако имате усещане, че ефектът на това лекарство е твърде силен или твърде слаб, поговорете с Вашия лекар.

Ако забравите да приемете доза:

Не взимайте двойна доза, за да компенсирате забравената доза.

Ако вземете повече APAP Extra, от колкото трябва:

Възможно е да се появят гадене, повръщане, прекомерно изпотяване, сънливост или безсъние, обща отпадналост, болки в корема, увеличено уриниране, дехидратация и треска. *Ако сте взели повисока от препоръчителната доза от това лекарство, незабавно се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.*

4. Възможни нежелани реакции

Подобно на всички лекарства, APAP Extra може да има нежелани реакции. Те включват:

- кожни алергични реакции (уртикария, обрив)
- stomashnochrevен тракт: гадене, нарушен храносмилане,
- сърдечносъдова система: сърдечни аритмии
- централната нервна система: безсъние, нарушена концентрация на вниманието, треперене на мускулите, раздразнителност
- кръвотворна система: рядко агранулоцитоза, много рядко тромбоцитопения

Когато това лекарство се използва като основно средство на лечение, нежеланите реакции са редки.

При някои пациенти може да се появят и други нежелани реакции, когато употребяват това лекарство. Ако забележите нежелана реакция, която не е описана в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар.

5. Съхранение на APAP Extra

Да се съхранява при температура под 25°C, на недостъпно и невидимо за деца място.

Не използвайте това лекарство след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Ако имате въпроси или се съмнявате в нещо, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

6. Допълнителна информация за APAP Extra

За по-подробна информация, моля, свържете се с представител на притежателя на разрешението за употреба:

Притежател на разрешението за употреба:

US Pharmacia Sp. z. o.o.

Офис във Варшава:

Puławska 43 5 A

02-801 Warsaw, Poland

Тел.: +48 (22) 5436000

Представител за България

ЕТ „Феникс медика – Ася Попова”

Ул. „Горски пътник” 23 a

София

Последна редакция на листовката:

