

ИАЛ
ОДОБРЕНО:
ДАТА: 13.03.07

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Metformin-Tchaikapharma 850 mg film-coated tablets
Метформин-Чайкафарма 850 mg филмирани таблетки

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Пазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Запомните – това лекарство е изписано само за Вас!

В тази листовка:

1. Какво представлява Метформин-Чайкафарма и за какво се използва
2. Преди да приемете Метформин-Чайкафарма
3. Как да приемате Метформин-Чайкафарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Метформин-Чайкафарма
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕТФОРМИН-ЧАЙКАФАРМА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Името на Вашето лекарство е Metformin-Tchaikapharma (Метформин-Чайкафарма) филмирани таблетки и тяхната активна съставка е Metformin hydrochloride (Метформин хидрохлорид). Във всяка филмирана таблетка се съдържат 850 mg метформин хидрохлорид.

Метформин-Чайкафарма филмирани таблетки принадлежи към групата на пероралните антидиабетични средства. Използва се за понижаване на кръвната захар при възрастни пациенти с диабет (захарен диабет тип 2 при възрастни), особено с наднормено тегло. Диабетът най-често се проявява, в резултат на резистентност към действието на инсулина или е редуцирана неговата секреция. Метформин спомага за възстановяване на неговото действие.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ МЕТФОРМИН-ЧАЙКАФАРМА

Не приемайте Метформин-Чайкафарма филмирани таблетки:

- ако сте алергични към Метформин хидрохлорид или към някои компоненти, влизащи в състава на таблетките (виж т.б „Допълнителна информация“).



Обърнете специално внимание при употребата на Метформин-Чайкафарма филмирани таблетки

Преди да започнете да взимате таблетките, кажете на Вашия лекар ако сте бременна, опитвате се да забременеете или кърмите.

Консултирайте се с Вашият лекар ако:

- имате сърдечни нарушения.
- имате бъбречна недостатъчност или проблеми с бъбреците.
- имате чернодробна недостатъчност или сте имали чернодробно заболяване.
- имате остро инфекциозно заболяване.
- редовно употребявате алкохол. Алкохолът може да понижи нивото на кръвната захар.

Вашият лекар ще реши дали да взимате това лекарство и дали трябва да се промени дозата.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или насконо сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт, като:

- лекарства за сърце или за високо кръвно налягане като калциеви антагонисти (верапамил, аденоцин и др.); дигоксин; антиаритмични лекарства (верапамил, хинидин и др.)
- други антиадиабетични средства (манинил, глиемепирид, инсулин и др.)
- лекарства за язвена болест на stomаха (хербазол, циметидин, ацидрин и др.)
- диуретици като фуроземид, амилорид и триамтерен или ванкомицин

Употребата на тези лекарства заедно с метформин може да доведе до високи нива на метформин в кръвта, което може да повиши честотата на нежеланите реакции.

Някои лекарства като тиазидни диуретици (напр. хидрохлортиазид), кортикоステроиди (като преднизолон, хидрокортизон и др.), тиреоактивни средства (лекарства за щитовидна жлеза), орални контрацептиви (противозачатъчни таблетки), могат да повишат нивата на кръвната захар, което от своя страна може да понижи ефективността на метформин.

Употреба на Метформин-Чайкафарма с храни и напитки

Метформин-Чайкафарма трябва да се приема по време на хранене, за да се намалят нежеланите ефекти, като гадене, повръщане, стомашна болка, диария и анорексия.

Бременност и кърмене

По време на бременност употребата на Метформин-Чайкафарма се забранява! Вместо това, Вашият лекар би могъл да контролира Вашата кръвна захар чрез диета или чрез комбинация от диета и инсулин.

По време на кърмене не трябва да се приемат лекарства, освен в случаите, когато Вашия лекар прецени за необходимо.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство по време на бременност или кърмене!

Шофиране и работа с машини

Метформин-Чайкафарма само по себе си не повлиява способността за шофиране, ако заедно с Метформин-Чайкафарма вземате други лекарства, които понижават кръвната захар, е възможно техният комбиниран ефект да причини световъртеж, припадъци или слабота.



Не шофирайте или използвайте каквато и да е техника или машини, ако се появяват тези усещания, докато не се възстановите.

Важна информация относно някои от съставките на Метформин-Чайкафарма

В състава на Метформин-Чайкафарма филмирани таблетки като помощно вещество се съдържа Пропилиен гликол.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МЕТФОРМИН-ЧАЙКАФАРМА

Винаги приемайте Метформин-Чайкафарма филмирани таблетки точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната начална доза е веднъж дневно, приемана по време на хранене. Дозата се увеличава с 850 mg на всеки две седмици, разделена на няколко приема. Максималната дневна доза Метформин-Чайкафарма филмирани таблетки е 3 g. Дози над 2 g се понасят по-добре, ако се премат три пъти дневно по време на хранене. Филмираните таблетки се погълват цели. Никога не се чупят или дъвчат!

Ако имате усещането, че действието на лекарството е твърде силно, т.е. причинява повече странични ефекти или е твърде слаб, т.е. не повлиява количеството на кръвната захар, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Метформин-Чайкафарма

Ако сте приели повече от необходимата доза и се проявят необичайни симптоми, незабавно уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Метформин-Чайкафарма

Вземете пропуснатата таблетка веднага щом се сетите. Ако обаче е време за следващата доза/следващия прием, не вземайте пропуснатата таблетка, вземете следващата в обичайното време и продължете лечението.

Ако сте спрели приема на Метформин-Чайкафарма

Не спирайте лечението, освен ако това не Ви е предписано от Вашия лекар. Спирането на лекарството може да причини повишение в нивото на кръвната захар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Метформин-Чайкафарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Най-честите странични ефекти са гадене, повръщане, стомашна болка, диария, загуба на апетит и метален вкус в устата. Тези симптоми обикновено са краткотрайни, появяват се често в началото на лечението и отминават спонтанно. Приемът на лекарството по време на хранене спомага за подтискането на страничните ефекти.



В редки случаи метформин може да предизвика появата на сериозен страничен ефект, наречена лактатна ацидоза, която се характеризира с натрупване на млечна киселина в кръвта Ви и може да доведе до сериозни увреждания. Когато вземате Метформин-Чайкафарма филмирани таблетки е важно черният Ви дроб да функционира нормално, тъй като той е отговорен за отстраняването на млечната киселина от кръвта Ви. Симптомите са отпадналост, умора или дискомфорт, необичайна мускулна болка, затруднено дишане, необичаен или неочекван стомашен дискомфорт, чувство на студ, замаяност, световъртеж и сърцевиене. Ако имате симптоми на лактатна ацидоза незабавно уведомете Вашия лекар. Лактатната ацидоза е спешно състояние, изискващо болнично лечение.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА МЕТФОРМИН-ЧАЙКАФАРМА

Както всички лекарства, Метформин-Чайкафарма филмирани таблетки трябва да се съхраняват на място, далеч от погледа и достъпа на деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не употребявайте таблетките след изтичане на срока на годност, обозначен върху външната опаковка.

Винаги връщайте неизползваните таблетки на Вашия фармацевт, освен ако Вашия лекар не е казал нещо друго.

Не използвайте Метформин-Чайкафарма ако забележите промяна в цвета на таблетките.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Метформин-Чайкафарма

- Активната съставка е Метформин хидрохлорид
- Филмираните таблетки съдържат и помощни вещества, които участват в изграждането на таблетката: натриев нишестен гликолат (тип A), повидон (PVP K-30), царевично нишесте, магнезиев стеарат, силициев диоксид, колоиден безводен (Aerosil 200), хипромелоза (E-15), макрогол (PEG-6000), талк, титанов диоксид, пропилен гликол.

Как изглежда Метформин-Чайкафарма и какво съдържа опаковката

Във всяка една картонена кутия Метформин-Чайкафарма 850 mg филмирани таблетки се съдържат 3 блистера с по 10 бели до светлокремави, овални, със заоблени ръбове, двойноизпъкнали филмирани таблетки.



Притежател на разрешението за употреба
“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
гр. Варна 9010, “Н.Й.Вапцаров” № 1, България

Производител
“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
гр. Пловдив 4000, бул. “Санкт Петербург” 53, България

Срок на годност
4 години

Дата на последно одобрение на листовката

Март 2007

