

Информация за пациента

ИАЛ
ОДОБРНОИ
ДАТА 26.06.07

Синекод сироп 200 ml/Sinecod syrup 200 ml

Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като съдържа важна за вас информация.

Това лекарство е достъпно без рецепт. Въпреки това е необходимо да го използвате внимателно, за да постигнете най-добри резултати от него.

- Пазете листовката, може да се наложи да я прочетете отново.
- Политайте вашия лекар или фармацевт, ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет.
- Посетете вашия лекар, ако симптомите се влошат или не се подобрят след 5 до 7 дни.

В тази листовка:

1. Какво е Синекод и за какво се използва?
2. Преди да вземете Синекод
3. Как да приемате Синекод?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как трябва да съхранявате Синекод?
6. Допълнителна информация

1. Какво е Синекод и за какво се използва?

Синекод съдържа активна съставка, която потиска кашлицата (Butamirate citrate).

Помощни вещества: сорбитол, глицерол, захарин натрий, бензоена киселина, ванилин, етанол, натриев хидроксид, дестилирана вода.

Синекод се използва за симптоматично лечение на непродуктивна кашлица, за потискане на кашлицата преди и след хирургични процедури и бронхоскопия, при коклюш.

2. Преди да вземете Синекод

Прочетете следната информацията, преди да използвате Синекод.

Сиропът е подсладен със захарин и сорбитол. Неподходящ е при вродена непоносимост към фруктоза.

Не използвайте Синекод:

Ако сте алергични към някоя от съставките му.

Едновременна употреба с други лекарства:

Избягвайте едновременната употреба с други лекарства за лечение на кашлица, защото това може да доведе до задържане на секрет в дробовете ви.

Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или доскоро сте употребявали други медикаменти, дори такива без рецепт.

Ако сте бременна или кърмите:

Както при други лекарства консултирайте се с вашия лекар, преди да вземете Синекод, ако сте бременна или кърмите.

Шофиране и работа с машини:

Синекод може да повлияе бдителността у някои хора. Ако това се прояви при вас, трябва да повишите вниманието си при шофиране или работа с машини.



3. Как да използвате Синекод?

Не използвайте Синекод за период, по-дълъг от 1 седмица, без консултация с лекар.

Дозировка за деца

Деца от 3 до 6 год. – 5 ml (1 чаена лъжичка) 3 пъти дневно

От 6 до 12 год.- 10 ml (2 чаени лъжички) 3 пъти дневно

Деца над 12 год. – 15 ml (1 супена лъжица) 3 пъти дневно

Дозировка за възрастни и деца над 12 години:

Сироп

Деца над 12 год. – 15 ml (1 супена лъжица) 3 пъти дневно

Възрастни – 15 ml (1 супена лъжица) 4 пъти дневно

Какво да правим, ако е погълнат твърде много Синекод?

Консултирайте се с вашия лекар в случай на предозиране.

4. Какви нежелани ефекти може да има Синекод?

Както всички лекарства Синекод може да предизвика у някои хора и нежелани ефекти. В редки случаи е възможно да се появят сънливост, кожни обриви, гадене, диария. Тези оплаквания изчезват веднага след намаляване на дозата или спиране на терапията. Ако те се задържат, спрете употребата на Синекод и се посъветвайте с лекар или фармацевт. Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако забележите някой друг ефект, който смятате, че може да е свързан с употребата на Синекод.

5. Как да съхранявате Синекод

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Условия на съхранение:

Да се съхранява под 30 °C

Срок на годност:

Не използвайте Синекод след срока на годност, отбелязан на опаковката.

6. Допълнителна информация

Синекод сироп е наличен в тъмно стъклено шише от 200 ml

Производител

Novartis Consumer Health SA, Nyon, Switzerland

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Consumer Health GmbH, 81379 München, Germany

Последна редакция на листовката:

Март 2006 г.

