

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 16.01.07

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Прочетете внимателно цялата листовка , защото тя съдържа важна информация за Вас.

Този лекарствен продукт се отпуска без рецепт , така , че може да лекувате някои заболявания без помощ от лекаря. Все пак трябва да употребявате внимателно този продукт , съобразно информацията предоставена в тази листовка за да получите най-добри резултати.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от съвет , моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите Ви се влошват или не се подобряват след 10 дни , трябва да се свържете с лекар.

АПАР - АПАП

Paracetamol

500 mg филмирани таблетки

Този лекарствен продукт съдържа Парацетамол.

Състав

1 таблетка съдържа :

Активно вещество : Paracetamol – 500.0 mg

Помощни вещества: прежелатинизирано нишесте , натриева кроскармелоза , коповидон , хидроксипропил метилцелулоза , стеаринова киселина , полиетилен гликол , карнаубски восък

Една опаковка съдържа :

6 таблетки в един AL/PVC фолио блистер в картонена кутия с листовка за пациент

12 таблетки в един AL/PVC фолио блистер в картонена кутия с листовка за пациент

24 таблетки в два AL/PVC фолио блистера в картонена кутия с листовка за пациент

50 таблетки в пластмасов контейнер , картонена кутия с листовка за пациент

Притежател на разрешението за употреба

Cosmedica Sp. Z o.o.

Villardczykow 1/5, 02-798 Warszawa, Poland

Производител:

US Pharmacia Sp. Z o.o.

ul. Ziebicka 40, 50-507 Wroclaw, Poland

В тази листовка пише:

1. Какво представлява АПАП и за какво се използва ?



2. Преди да използвате АПАП
3. Как да приемате АПАП ?
4. Евентуални нежелани реакции
5. Съхраняване на АПАП

1. Какво представлява АПАП и за какво се използва ?

АПАП е ефективно противоболково и понижаващо температурата средство. Съдържа Парацетамол , който не дразни стомашно-чревната система. Поради профила си на безопасност , то е лекарство , което е средство на избор за лечение на болка и висока температура.

Показан е за симптоматично облекчаване при болка от различен произход - главоболие , включително мигрена , мускулни болки , зъббол , дисменорея , костни и ставни болки , болки след операции и травми. Облекчаване на симптомите на простуда и грип като : температура, възпалено гърло , болки в мускулите , костите и ставите.

2. Преди да използвате АПАП

Не приемайте този продукт ако :

Имате данни за свръхчувствителност към парacetamol или към някоя от помощните съставки на продукта , както и в случай на тежка чернодробна или бъбречна недостатъчност , по време на лечение с MAO инхибитори и две седмици след преустановяване на употребата им , както и при деца под 12 години

Трябва да обърнете специално внимание при прием на АПАП ако :

Имате вроден недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа или метхемоглобин редуктаза , чернодробна или бъбречна недостатъчност и бронхиална астма. Пациентите с чернодробна недостатъчност , алкохолиците и гладуващите , които приемат този продукт, са с риск за развитие на чернодробно увреждане. По време на лечението , консумацията на алкохол не е позволена поради риска от токсично увреждане.

Употреба с хани и напитки

Храната не намалява резорбцията на активното вещество

Бременност


Потърсете съвет от лекаря преди да приемате този лекарствен продукт.

Кърмене

Потърсете съвет от лекаря преди да приемате този лекарствен продукт.

Шофиране и работа с машини

Приемът на този лекарствен продукт не влияе върху психомоторната способност.



Употреба на други лекарствени продукти

Този продукт не трябва да се приема едновременно с други лекарствени продукти, съдържащи парацетамол, МАО инхибитори дори 2 седмици след преустановяване на употребата им, както и едновременно със зидовудин. Парацетамол може да засили ефектите на антикоагуланти / варфарин , кумарин/. Едновременното прилагане на рифампицин , изониазид , антиепилептични средства , барбитурати , дифлуназал , сулфинпиразон или други лекарствени вещества , които индуцират чернодробните микрозомни ензими може да доведе до увеличен риск от хепатотоксичност.

3. Как да приемате АПАП ?

Възрастни и деца над 12 години

1-2 таблетки на всеки 4-6 часа / максимално 8 таблетки дневно/
Не го давайте на деца под 12 години / Ограничението се дължи на лекарствената форма на продукта /.

Обърнете се за съвет съм Вашия лекар , ако болката продължи повече от 5 дни , а високата температура – повече от 3 дни.

Ако имате впечатление , че ефектът на този лекарствен продукт е много силен или много слаб , уведомете Вашия лекар .

Ако сте приели АПАП в по-голямо количество от необходимото

До 20 часа може да се появят следните симптоми : гадене , повръщане , силно изпотяване , сънливост и обща слабост.

Тези симптоми може да преминат на следващия ден , независимо от прогресирането на чернодробното увреждане , което се изразява с чувство на пълнота на епигастроума , рецидив на гаденето и жълтеница.

При всеки случай на погълдане на единична доза парацетамол 5 g или повече , трябва да се предизвика повръщане , ако не е минал повече от 1 час след приема и незабавно трябва да се консултирате с лекар. Препоръчва се орално приложение на 60-100 g активен въглен , за предпочтане смесен с вода , с цел , да се свърже останалото в стомаха лекарствено вещество.

Ако сте приели доза , по-висока от препоръканата , незабавно се консултирайте с лекар или фармацевт.

Ако сте забравили една доза ?

АПАП се използва за временно понижение на температурата и облекчение на болката. Той трябва да се приема според указанията, представени в раздела дозировка.

Не приемайте двойна доза, за да наваксвате пропуснатата доза.

4. Евентуални нежелани реакции

Подобно на всички лекарствени продукти АПАП може да има нежелани реакции, които са редки , когато се използва за кратко време. Те включват



- хематологични нарушения : тромбоцитопения , агранулоцитоза
- алергични реакции : уртикария , еритема , обрив , пигмента дерматоза , анафилактичен шок
- stomашно-чревни нарушения : остра чернодробна недостатъчност , гадене , повръщане , stomашно разстройство

Ако забележите други нежелани реакции , неописани в тази листовка , моля уведомете Вашия лекар.

5. Съхраняване на АПАП

Съхранявайте този лекарствен продукт при стайна температура от 15 до 25 ° C
Да се съхранява на места, недостъпни за деца.
Не използвайте този лекарствен продукт след изтичане срока на годност ,
означен върху опаковката.

6. Друга информация за АПАП

За по-подробна информация , моля свържете се с представителя на притежателя на разрешението за употреба:

Последна редакция на листовката:

27.10. 2005 г.

