

**Информация за пациента. Моля, прочетете внимателно!**

**DILCEREN®**

**ДИЛЦЕРЕН**

**Състав**

**Активна съставка**

Нимодипин 30 mg в 1 таблетка.

**Помощни вещества:**

Сърцевина: поливидон K 25, микрокристална целулоза, царевично нишесте, поливидон нерастворим, калциев стеарат;

Обвивка: метилхидроксипропилцелулоза, полиетиленгликол 600, талк, титанов двуокис.

**Действие**


Препарата Дилцерен е калциев антагонист със съдоразширяващо действие върху мозъчно-съдовата система.

**Показания**

Профилактика и лечение на недостатъчно мозъчно кръвоснабдяване, вследствие на артериални спазми свързани със субарахноидален кръвоизлив. Лечение на нарушения на мозъчното кръвообращение при възрастни, изявени с нарушения на паметта и концентрацията, раздразнителност и бърза промяна на настроението.

**Противопоказания**

Препарата не трябва да се прилага при генерализиран мозъчен оток, увеличено вътречерепно налягане, бременност, свръхчувствителност към нимодипин.



### Нежелани лекарствени реакции

Препарата обикновено се понася добре, но е възможно да се появят главоболие, зачеряване на лицето, увеличено изпотяване, стомашно-чревни оплаквания, гадене, горещи вълни, изразена хипотония.

В случай на появя на нежелани лекарствени реакции или други необичайни реакции, трябва да се посъветвате с лекар относно по-нататъшната употреба на препарата.

### Лекарствени взаимодействия

Действието на препарата Дилцерен и на други препарати, използвани едновременно, може взаимно да се повлияе.

При едновременно приложение, Дилцерен засилва действието на лекарствени средства, понижаващи кръвното налягане. Да се избягва интравенозното приложение с бета-блокери поради увеличения рисък от изразена хипотония и сърдечна недостатъчност. Серумните нива на нимодипин може да бъдат намалени в резултат на едновременна употреба с фенитоин, фенобарбитал или карбамазепин.

### Дозировка и начин на приложение

Дозировката се определя от лекуващия лекар. При субарахноидален кръвоизлив, препоръчителната доза през първите 14-21 дни е 6 x 2 таблетки дневно, последвани от поддържаща доза от 6 x 1 таблетка дневно.

При хронични нарушения на мозъчното кръвообращение, препоръчваната доза е 3 x 1 таблетка дневно, по възможност по едно и също време от деня. Интервалът между две последователни дози не трябва да бъде по-малък от 4 часа.

### Начин на приложение

Препарата се приема след хранене, с малко количество течност, без да се чупи или дъвче.

### Съхранение

На сухо място, при температура до 25° С, защитено от светлина.

### Внимание

Препарата се съхранява на места, недостъпни за деца!

Препарата не трябва да се употребява след изтичането на срока на годност, който е отбелязан на опаковката.

### Срок на годност

5 години.

### Лекарствена форма и опаковка

50 таблетки по 30 mg

### Притежател на разрешението за употреба

Словакофарма АД

Хлоховец

Словашка република

### Адрес за контакти

Словакофарма България ООД

ул "Голо бърдо" № 22

София 1407

тел. 9 62 41 91, 9 62 41 40

Последна редакция : Декември 2000 г.

