

## Информация за пациента

### Синекод перорални капки 20 ml/Sinecod oral drops 20 ml

ИАЛ  
ОДОБРЕН  
ДАТА 26.06.07

Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като съдържа важна за вас информация.

Това лекарство е достъпно без рецепт. Въпреки това е необходимо да го използвате внимателно, за да постигнете най-добри резултати от него.

- Пазете листовката, може да се наложи да я прочетете отново.
- Попитайте вашия лекар или фармацевт, ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет.
- Посетете вашия лекар, ако симптомите се влошат или не се подобрят след 5 до 7 дни.

#### В тази листовка:

1. Какво е Синекод и за какво се използва?
2. Преди да вземете Синекод
3. Как да приемате Синекод?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как трябва да съхранявате Синекод?
6. Допълнителна информация

#### 1. Какво е Синекод и за какво се използва?

Синекод съдържа активна съставка, която потиска кашлицата (Butamirate citrate).

Помощни вещества: сорбитол, глицерол, захарин натрий, бензоена киселина, ванилин, етанол, натриев хидроксид, дестилирана вода.

Синекод се използва за симптоматично лечение на непродуктивна кашлица, за потискане на кашлицата преди и след хирургични процедури и бронхоскопия, при коклюш.

#### 2. Преди да вземете Синекод

Прочетете следната информацията, преди да използвате Синекод.

#### Не използвайте Синекод:

Ако сте алергични към някоя от съставките му.

#### Едновременна употреба с други лекарства:

Избягвайте едновременната употреба с други лекарства за лечение на кашлица, защото това може да доведе до задържане на секрет в дробовете ви.

Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или доскоро сте употребявали други медикаменти, дори такива без рецепт.

#### Ако сте бременно или кърмите:

Както при други лекарства консултирайте се с вашия лекар, преди да вземете Синекод, ако сте бременно или кърмите.

#### Шофиране и работа с машини:

Синекод може да повлияе бдителността у някои хора. Ако това се прояви при вас, трябва да повишите вниманието си при шофиране или работа с машини.

#### 3. Как да използвате Синекод?

Не използвайте Синекод за период, по-дълъг от 1 седмица, без консултация с лекар.



## **Дозировка за деца**

### **Перорални капки:**

Деца от 2 мес. до 1 год. - 10 капки 4 пъти дневно

От 1 до 3 год. - 15 капки 4 пъти дневно

Над 3 год. - 25 капки 4 пъти дневно

## **Какво да правим, ако е погълнат твърде много Синекод?**

Консултирайте се с вашия лекар в случай на предозиране.

## **4. Какви нежелани ефекти може да има Синекод?**

Както всички лекарства Синекод може да предизвика у някои хора и нежелани ефекти. В редки случаи е възможно да се появят сънливост, кожни обриви, гадене, диария. Тези оплаквания изчезват веднага след намаляване на дозата или спиране на терапията. Ако те се задържат, спрете употребата на Синекод и се посъветвайте с лекар или фармацевт. Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако забележите някой друг ефект, който смятате, че може да е свързан с употребата на Синекод.

## **5. Как да съхранявате Синекод**

**Да се съхранява на място, недостъпно за деца!**

### **Условия на съхранение:**

Да се съхранява под 30 °C

### **Срок на годност:**

Не използвайте Синекод след срока на годност, отбелязан на опаковката.

## **6. Допълнителна информация**

Синекод капки са налични в тъмно стъклено шише от 20 ml

### **Производител**

Novartis Consumer Health SA, Nyon, Switzerland

### **Притежател на разрешението за употреба**

Novartis Consumer Health GmbH, 81379 München, Germany

### **Последна редакция на листовката:**

Март 2006 г.

