

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 07.08.07

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате никакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го преотстъпвате на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите както Вашите.

В тази листовка:

1. Какво представлява MAXIDEX и за какво се използва
2. Преди да използвате MAXIDEX
3. Как да използвате MAXIDEX
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на MAXIDEX
6. Допълнителна информация

MAXIDEX е eye ointment

МАКСИДЕКС маз за очи

- Лекарственото вещество е дексаметазон 1 mg/g.
- Помощните вещества са метил-парахидроксибензоат (E218), пропил-параидроксибензоат (E216), безводен течен ланолин и бял вазелин.

Притежателят на разрешението за употреба за MAXIDEX маз за очи е Алкон България ЕООД, ул. Димитър Манов 10, ет. 1, София 1408, България.

Производителят на MAXIDEX маз за очи е SA ALCON-COUVREUR NV, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Белгия.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MAXIDEX И ЗА КАКВО СЕ ИЗПЛОЗВА

MAXIDEX се използва за лечение на не-инфекциозни външни възпалителни и алергични състояния на окото, включително и следоперативно възпаление.

MAXIDEX е представител на група лекарства, наричани кортикоステроиди. Той подпомага предотвратяването или намаляването на очното възпаление.

MAXIDEX е бяла или почти бяла до бледо жълта хомогенна маз за очи, която се доставя в опаковка, съдържаща туба от 3.5 g с пластмасов накрайник и пластмасова капачка.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ MAXIDEX

Не използвайте MAXIDEX:

- ако сте свръхчувствителни (алергични) към дексаметазон или към някоя от останалите съставки на MAXIDEX маз за очи.
- ако се съмнявате, че имате очна инфекция.

Обърнете специално внимание при употребата на MAXIDEX:

- ако се лекувате от херпес симплекс. Посъветвайте се с Вашия лекар, ако състоянието Ви се влоши или не се подобри.



- ако използвате MAXIDEX продължително време или много често, това може да доведе до увеличение на вътречното налягане, до развитие на катаркта и до повищена чувствителност към очни инфекции. Вашият лекар би следвало регулярно да проверява очите Ви.
- ако страдате от глаукома. Тъй като MAXIDEX може да увеличи вътречното налягане, Вашият лекар би следвало да го следи регулярно.
- употребата на кортикоステроиди може да активира, маскира остри гнойни очни инфекции или да доведе до тяхното влошаване.
- ако страдате от нарушение, при което се наблюдава изтъняване на външната страна на очната ябълка (роговица или склера). Понякога при продължителна употреба на локално прилагани кортикостероиди, се наблюдава перфорация на тези защитни обвивки на очната ябълка.
- използвайте този лекарствен продукт толкова дълго, колкото Ви е предписан Вашият лекар. Не преустановявайте лечението преждевременно. Ако състоянието Ви се влоши или не се подобри, посъветвайте се с Вашия лекар.
- повърхностно прилаганите в окото кортикостероиди, както и мази за очи, могат да забавят заздравяването на очната рана.

Важна информация за някои от съставките на MAXIDEX:

Лекарственият продукт съдържа метил-парахидроксибензоат и пропил-парахидроксибензоат (като консерванти), за които е известно, че могат да причинят уртикария.

Не е изследвана ефективността и безопасността на лекарствения продукт при деца.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на който и да е лекарствен продукт.

Шофиране и работа с машини:

Възможно е непосредствено след поставянето на MAXIDEX да се появи краткотрайно замъгливане на зрението. Вие трябва да изчакате докато зрението Ви се проясни и едва тогава да шофирате или да работите с машини.

Употреба на други лекарства:

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или доскоро сте приемали някакъв друг лекарствен продукт. Не забравяйте също така да споменете и лекарствата, които сте закупили без рецепт.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ MAXIDEX

Винаги използвайте MAXIDEX точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е малко количество (лентичка с дължина приблизително 1,5 cm) в конюнктивния сак на засегнатото око(очи), веднъж до четири пъти дневно. Продължителността на лечението е по преценка на Вашия лекар.



Използвайте MAXIDEX само за вашите очи.

ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Обърнете сега>



3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ MAXIDEX (продължение)



Колко да поставите

<виж страна 1

1. Вземете тубата MAXIDEX и огледало.
2. Измийте си ръцете.
3. Отвъртете капачката.
4. Дръжте тубата между палеца и показалеца.
5. Наклонете главата назад. Разтворете клепача, с почистения вече пръст, така че да се образува 'джоб' между него и окото. Лентичката маз трябва да попадне именно на това място (фигура 1).
6. Приближете накрайника на тубата близо до окото. Използвайте огледалото, ако това Ви улеснява.
7. Не докосвайте окото, клепача, заобикалящата ги площ или други повърхности с накрайника. Това може да замърси лекарствения продукт.
8. Внимателно стиснете тубата, за да изпусне лентичка от MAXIDEX маз за очи (фигура 2).
9. След като поставите MAXIDEX, пуснете клепача, мигнете няколко пъти, за да е сигурно, че лекарственият продукт е покрил цялата повърхност на окото. Внимателно затворете окото(очите) за няколко секунди; това е необходимо, за да попречите MAXIDEX да премине към другите части на тялото.
10. Ако е необходимо да поставите MAXIDEX маз за очи и в двете очи, повторете всички предходни стъпки и за другото око.
11. Затворете добре тубата веднага след употреба.
12. Използвайте само една и съща туба.

Ако MAXIDEX маз за очи не попадне в окото, опитайте отново.

Ако сте пропуснали да поставите MAXIDEX, поставете дозата когато се сетите. Ако е време за следващата Ви доза, продължете по Вашата обичайна схема. Не поставяйте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте поставили повече от необходимото количество MAXIDEX:

Ако е необходимо, MAXIDEX може да се измие от окото(очите) с хладка вода.

Ако използвате и други лекарствени продукти за очи, изчакайте десет до петнайсет минути между поставянето на различните лекарствени продукти, като поставяте MAXIDEX маз за очи последно.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Като всички лекарствени продукти, MAXIDEX може да предизвика нежелани лекарствени реакции

Много редки нежелани реакции; следното може да засегне 1 на всеки 10 000 пациенти:
Очни нежелани реакции: високо вътрешно налягане, очень дискомфорт, разширени зеници, възпаление, анормално усещане в окото, падащ клепач.



Обикновено, Вие можете да продължите употребата на лекарствения продукт, освен ако реакциите не са сериозни. Ако нещо Ви притеснява, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако забележите нежелани лекарствени реакции, не описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА MAXIDEX

Тубата трябва да се изхвърли 4 седмици след първото отваряне, за да бъдат избегнати евентуални инфекции. За Ваше улеснение Ви препоръчваме да напишете датата на отваряне върху опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.

Да не се замразява.

Да се съхранява в плътно затворена опаковка.

Не използвайте лекарствения продукт след срока на годност, обявен върху тубата и картонената кутия (отбелязан като 'Годен до').

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се:

България
Алкон България ЕООД
ул. Димитър Манов 10, ет.1
София 1408
Тел: + 359 2 950 1565
Факс: + 359 2 954 9755

Дата на последно одобрение на листовката XXXXXXXX.

