

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Bilobil forte 80 mg hard capsules

Ginkgo bilobae folii extractum siccum normatum

Билобил форте 80 mg твърди капсули

сух екстракт от листа на гинко билоба

ИАЛ

ОДОБРЕНО!

ДАТА 2/03, 09.2007

при нарушения на мозъчното оросяване

Прочетете внимателно листовката, преди да започнете да използвате този лекарствен продукт, защото тя съдържа важна за Вас информация.

Този лекарствен продукт се предлага без лекарско предписание за лечение на по-леки заболявания, които не изискват лекарска помощ. Въпреки това, Вие трябва да го използвате внимателно, за да получите най-добър резултат.

- Запазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Консултирайте се с Вашия фармацевт, ако имате допълнително въпроси.
- Ако симптомите на заболяването не се подобрят до 30 дни, трябва да се консултирате с лекар.
- Ако някои от неожеланите реакции станат сериозни, или забележите неожелани реакции, които не са споменати в тази листовка, моля, съроясете се с Вашия лекар или фармацевт

В тази листовка:

1. Какво е Bilobil forte и за какво се използва?
2. Преди да започнете да приемате Bilobil forte
3. Как да приемате Bilobil forte
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да се съхранява Bilobil forte
6. Допълнителна информация

1. КАКВО Е BILOBIL И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Капсулите Bilobil forte съдържат стандартизиран екстракт от листа на гинко, който подобрява снабдяването на мозъка с кислород и глукоза. Активните вещества от екстракта, flavонови гликозиди, гинколиди и билобалид, разширяват кръвоносните съдове, подобряват кръвообръщението, предпазват от слепване на тромбоцитите и чрез регулиране на метаболизма, предпазват клетките и тъканите от увреждане, причинено от недостиг на кислород. Екстракта от листа на гинко е ефективен при нарушения на кръвоснабдяването на мозъка и крайниците.

Капсулите Bilobil forte подобряват мозъчното кръвообръщение и метаболизма и запазват интелектуалните възможности. При нарушения на кръвообръщението на крайниците, лекарственият продукт облекчава усещането за студ, бодежи, вкочаненост и болка при ходене.

Капсулите Bilobil forte са растителен продукт, който се препоръчва при леки до умерени нарушения на мозъчното оросяване, които се проявяват с:

- отслабване на паметта и на интелектуалните способности,
- неразположение и тревожност,
- световъртеж,
- шум в ушите (тинитус)
- главоболие и разстройство на съня.

и при нарушено кръвоснабдяване на крайниците



2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА УПОТРЕБЯВАТЕ BILOBIL FORTE

Не приемайте Bilobil forte:

- Ако сте свръхчувствителни (алергични) към екстракт на гинко или някое от помощните вещества на Bilobil forte.

Обърнете специално внимание

- ако приемате лекарствени продукти, които предотвратяват кръвосъсирването или, ако редовно приемате ацетилсалацицилова киселина. Едновременното приемане може да повиши риска от кървене.

Капсулите Bilobil forte не се препоръчват при деца, защото съществуват ограничени данни относно сигурността при употреба при деца.

Да не се приема по-висока от препоръчваната доза.

Да се прилага с внимание при кръвоизливи (стомашно-чревни, вътречерепни, ретинални).

Приемане на други лекарствени продукти

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали някакви други лекарствени продукти, включително и такива, които се отпускат без рецептa.

Капсулите Bilobil forte не се препоръчват, ако приемате лекарства, които предотвратяват кръвосъсирването или, ако редовно приемате ацетилсалацицилова киселина.

Приемане на Bilobil forte с храна и напитки

Вие можете да приемате капсулите Bilobil forte независимо от храненето. Няма данни за каквото и да било влияние на храна и напитки върху действието на гинко. Не е подходящо капсулите да се приемат с алкохолни напитки.

Бременност и кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате какъвто и да било лекарствен продукт.

Не се препоръчва на бременни жени и кърмачки да приемат Bilobil forte независимо, че не са наблюдавани увреждащи ефекти върху плода при изпитванията.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Няма съобщения за този лекарствен продукт да влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

Специални предупреждения за помощните вещества

Капсулите Bilobil forte съдържат лактоза. Ако Вашият лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

Параходроксибензоатите E216 и E218 и азо оцветителите E110, E124 и E151 могат да причинят реакции на свръхчувствителност. Възможни са и реакции от забавен тип. Азо оцветителите могат да причинят затруднения в дишането (бронхоспазъм).

3. КАК ДА СЕ УПОТРЕБЯВА BILOBIL FORTE?

Винаги приемайте Bilobil forte точно така, както ви е казал Вашия лекар. Ако за някое не сте сигурни консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е при:



- нарушения на кръвообращението и функционирането на мозъка: 1 капсула 2 до 3 пъти дневно

- при световъртеж и шум в ушите: 2 капсули дневно, сутрин и вечер

- при нарушение на кръвооросяването на крайниците: 2 капсули дневно, сутрин и вечер
Погълщайте капсулите с някаква течност. Можете да ги приемате независимо от храненето.

Първите признания на подобрене обикновено се наблюдават след 1-месечно лечение. За по-дълготраен ефект се препоръчва лекарственият продукт да се приема поне в продължение на 3 месеца, особено от възрастни пациенти. След 3 месеца се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт дали да продължите да приемате този лекарствен продукт.

Ако приемете повече Bilobil forte отколкото би трявало

Ако сте приемали по-висока доза от лекарствения продукт отколкото би трявало, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт незабавно.

Приемайки количеството екстракт в капсулите, вероятността от предозиране е практически невъзможна. Няма съобщения за интоксикация с екстракт на гинко.

Ако забравите да вземете Bilobil forte

Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарствени продукти, Bilobil forte може също да прояви нежелани реакции, въпреки, че не всеки може да ги прояви.

В много редки случаи (при по-малко от 1 на всеки 10 000 лекувани пациенти), употребата на капсулите може да доведе до по-леки стомашночревни нарушения, главоболие или реакции на свръхчувствителност на кожата (сърбеж, зачеряване, оток). При появя на алергична реакция, спрете приемането на капсулите и се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако някои от нежеланите реакции станат сериозни или, ако забележите каквото и да било нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА BILOBIL FORTE

Условия за съхранение

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да се пази от влага. Да се съхранява под 25°C.

Срок на годност

Да не се използва Bilobil forte след срока на годност, отбелзан върху опаковката.

Срока на годност се отнася до последния ден от месеца.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Bilobil forte

Активното вещество е стандартизиран сух екстракт от листа на гинко (Ginkgo biloba folii extractum siccum normatum).



Всяка твърда капсула съдържа 80 mg сух екстракт от листа на гинко 35-67 : 1, стандартизириани, така, че съдържат не по-малко от 19,2 mg ginkgo флавоноиди, калкулирани като флавонови гликозиди и 4.8 mg терпенови лактони (гинколиди, билобалиди).

Екстракционен разтворител: ацетон 60% (m/m).

Помощните вещества са: съдържание на капсулата: лактоза монохидрат, колоиден силиций, безводнен, царевично нишесте, магнезиев стеарат, талк, съдържание на обвивката: метил паракидроксибензоат (E218), пропил паракидроксибензоат (E216), желатина, оцветител черен PN (E151), оцветител син V (E131), оцветител червен 4R (E124), оцветител оранжев FCF (E110), титаниев диоксид (E171)

Как изглеждат капсулите Bilobil forte и какво е съдържанието на опаковката

Твърдите капсули са виолетово-кафяви; капсулите съдържат светло кафяв до тъмно кафяв прах.

Лекарственияят продукт се предлага в опаковки от 20 и 60 твърди капсули в блистерна опаковка. Всеки блистер съдържа 10 капсули.

Производител и притежател на разрешението за употреба

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Информация за предписване

Без лекарско предписание.

Дата на последна корекция

30 Март 2006

