

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 07.08.07

Solpaflex* Tablets
Солпафлекс* Таблетки

Моля прочетете листовката внимателно.

Състав: Всяка таблетка Солпафлекс съдържа като лекарствено вещество 200 mg. Ibuprofen.

Всяка таблетка съдържа и неактивни вещества: царевично нишесте, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, лактоза, колоидален силициев диоксид, кроскармелоза натрий.

Филмовата обвивка съдържа хидроксипропил метилцелулоза и триацетин. Печатното мастило съдържа етанол, одобрен за хранителни нужди, шел лак, червен оцветител Е 172 (еритрозин), натриев пропионат и деминерализирана вода.

Солпафлекс таблетки са в блистери, съдържащи 12 таблети. 1, 2 или 4 блистера са опаковани в картонена кутия.

Показания: Солпафлекс таблетки се препоръчват за облекчаване на слаба до средно силна болка и леки възпаления при състояния като: - навсяхвания, ревматични болки, лека форма на артрити, лумбаго, фиброзити, болки в гърба, мускулни болки, зъббол, менструални болки, главоболие, мигрена, невралгии, симптоми на простуда и грип.

Също така е показан за понижаване на високата температура.

Характеристики: Солпафлекс таблетки съдържа ибупрофен, който е от групата на лекарствата, наречени нестероидни, противовъзпалителни средства. Ибупрофен е аналгетик, който облекчава болката, редуцира възпалението и понижава високата температура.

Противопоказания: **Не взимайте това лекарство, ако:**

- сте алергични към ибупрофен или към някоя от другите съставки, посочени по-горе или към аспирин или други нестероидни, противовъзпалителни лекарства. (Алергичните реакции включват астма, ринити или уртикария).
- страдате от дуоденална или стомашна язва или други стомашни нарушения.
- вземате аспирин или други нестероидни, противовъзпалителни лекарства.

Предупреждения / внимание при употреба: Преди да вземете Солпафлекс таблетки, консултирайте се с Вашия лекар, ако:

- страдате от астма;



- ако са Ви предписани лекарства за разреждане на кръвта (антикоагуланти), за високо кръвно налягане (анти-хипертензивни) или за отстраняване излишното количество вода от тялото (диуретици);
- имате чернодробни или бъбречни проблеми;
- сте бременна или кърмите;
- имате намерение да забременявате.

Лекарства като Solpaflex могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент ("миокарден инфаркт") или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и продължително лечение. Не превишавайте препоръчените дози и продължителността на лечението. Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например, ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка:

Възрастни и деца на и над 12 години:

Да се взимат една или две таблетки три пъти дневно. **Не взимайте повече от шест таблетки за 24 часа. Да не се взимат през периоди по-кратки от четири часа.**

Да не се дава на деца под 12 години освен по лекарски съвет.
Солпафлекс таблетки трябва да се приемат с вода.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

Не надвишавайте посочената доза. Ако вземете повече от лекарството, кажете на Вашия лекар или на спешното отделение в местната болница незабавно. Вземете опаковката с Вас.

Нежелани лекарствени реакции: При повечето хора, Солпафлекс таблетки няма да причини никакви проблеми. Въпреки това, както при всички лекарства, понякога могат да се появят нежелани странични реакции. Ако изпитате никакви необичайни реакции, спрете приема на Солпафлекс таблетки и се консултирайте с Вашия лекар. Следните видове нежелани реакции могат да се наблюдават:

- Стомашна болка, гадене и стомашни проблеми;
- Рядко може да се получи стомашно кървене, главоболие, виене на свят, пищене в ушите, алергични реакции като бронхоспазъм, кожен обрив, сърбеж или уртикария (обрив);
- Рядко може да се наблюдават промени в кръвта, които могат да доведат до повърхностни кръвоизливи;
- Бъбречни или чернодробни проблеми.



SOLPAFLEX Tablets
Листовка за пациентта

Лекарства като Solpaflex могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърден инцидент ("миокарден инфаркт") или инсулт.

Срок на годност: 3 години. Да не се приема след датата, посочена на опаковката.

Условия на съхранение: Съхранявайте таблетките в оригиналната им опаковка при температура под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

GlaxoSmithKline Export Ltd.

Brentford, TW8 9GS, UK

(лого) GSK GlaxoSmithKline

* Solpaflex е запазена търговска марка.

