

**Моля, прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете приема на това лекарство.**

- Пазете листовката, може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Този лекарствен продукт е предписан само за Вас или Вашето дете. Не го давайте на други хора и не го употребявайте за други заболявания.
- Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите нежелани реакции, които не са посочени в тази листовка, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

**Vitreolent® капки за очи, разтвор 10 ml**

Активни вещества: всеки ml съдържа Potassium iodide 3 mg; Sodium iodide 3 mg

Помощни вещества: α-токоферол ацетат, сорбитол, хлороводородна киселина 1N, метилхидроксипропилцелулоза, вода за инжекции, хлорхексидин ацетат.

**1. Какво е Витреолент и за какво се използва?**

Както при системно, така и при локално приложение йодидите могат да активират метаболизма и понякога да възпрепятстват развитието на мътнини в стъкловидното тяло.

За сега не е установен ефектът на йода върху развитието на ранното старческо помътняване на очната леща.. Понякога е възможно да намали развитието на мътнини и влошаването на зрителната острота.

Помътняване и кръвотечение в стъкловидното тяло от различни причини (възрастови промени, късогледство, хипертония, диабет, перифлебит), помътняване на лещата като първа проява на старческа катаракта.

**2. Преди да прилагате Витреолент**

**НЕ използвайте Витреолент ако имате:**

- Известна свръхчувствителност към йод. (Йодизъм)
- Свръхчувствителност към някоя от съставките.
- Функционални нарушения на щитовидната жлеза или лека форма на възловидна гуша.

**Необходимо е повишено внимание с Витреолент**

Хлорхексидинът може да се отлага върху меки контактни лещи. Контактните лещи трябва да се свалят преди прилагане и трябва да се осигури интервал от 30 минути преди повторното им поставяне.

За да се намали системната резорбция, леко притиснете с пръст слъзната торбичка в продължение на 1-2 минути след прилагане на капките за очи.

**Бременност и кърмене.**

Моля уведомете лекуващия лекар, ако сте бременна или кърмите. Няма контролирани проучвания на животни или бременни жени. Затова лекарственият продукт може да се прилага само в тези случаи, когато лекуващият лекар е преценил, че потенциалните ползи надвишават риска за плода. Употребата на капки за очи Витреолент при кърмещи жени не е изследвана.



### **3. Как да прилагате Витреолент?**

**ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НАД 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ:** Препоръчителната дозировка е 1 капка в конюнктивния сак на засегнатото око/очи 1-3 пъти дневно.

**ПАЦИЕНТИ В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ:** Няма данни, че дозировката трябва да се променя.

**ДЕЦА ПОД 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ:** Безопасността на лекарствения продукт при деца не е проучвана. Следователно приложението при деца не се препоръчва.

### **4. Нежелани лекарствени реакции.**

При поява на нежелани реакции, пациента трябва да уведоми лекуващия си лекар.

а) локални ефекти (в окото):

Слабо парене или боцкане може да се усети за кратък период след приложение на капките. Понякога засилена слъзна секреция. Замъглено виждане.

б) системни ефекти:

Витреолент съдържа йодиди и поради това, може да предизвика повишена функция на щитовидната жлеза или подобни на акне ефекти у предразположени пациенти.

### **Лекарствени взаимодействия**

Не са докладвани взаимодействия със системно прилагани лекарствени продукти. В случаи на съществуваща очна терапия с други лекарства, трябва да има интервал от поне 5 минути между приложението на двете лекарства.

### **Влияние върху способността за шофиране**

Рядко може да се получи временно замъгляване на зрението. Пациентите със замъгляване на зрението след приложение на Витреолент трябва да се въздържат от шофиране и работа с машини, докато напълно се проясни зрението.

### **Предозиране**

Рискът от нежелани реакции, дължащи се на локално свръхдозиране или инцидентно перорално погълдане, е много ограничен, което се дължи на относително ниското съдържание на йодиди в един флакон.

### **5. Съхранение**

Да се съхранява под 25 °C

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

### **6. Допълнителна информация**

#### **Срок на годност**

Затворете флакона веднага след употреба. Не ползвайте повече от един месец след първоначалното отваряне. Лекарственият продукт може да се използва само до датата означена с "EXP" на опаковката.

#### **Опаковка**

Флакон с гутатор 10 ml.

**Регистрационен номер:** 9800275/03.08.1998

**Производител:** EXCELVISION AG, 8442 Hettlingen, Switzerland

**Притежател на разрешението за употреба:** Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429, Nuernberg, Germany

**Дата на последна редакция на текста:** 28.03.2007 г.

