

*Прочетете внимателно упътването, преди да започнете да вземате това лекарство, защото то съдържа важна за вас информация.*

*Това лекарство се отпуска без рецепт за лечение на по-леки заболявания без лекарска намеса. Независимо от това вие трябва да използвате лекарството внимателно, за да имате максимален ефект от него.*

*Пазете упътването. Може да ви се наложи да го прочетете отново.*

*Ако имате нужда от допълнителна информация или съвет, допитайте се до вашия лекар или фармацевт.*

*Трябва да се консултирате с лекар, ако не почувствате подобреие след 3-дневно лечение.*

**SEPTOLETE® D  
СЕПТОЛЕТЕ® Д  
таблетки за смучене**

**При възпаление на устата и гърлото  
без захар**

**ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА № 21/03.09.04**

#### **Състав**

1 таблетка за смучене съдържа 1.0 mg бензалкониев хлорид (Benzalkonii chloridum), 1.2 mg левоментол (Levomenthol), 1.0 mg ментово есенциално масло (Pippermint oil), 0.6 mg евкалиптово есенциално масло (Eucalyptus oil) и 0.6 mg тимол (Thymol).

*Други съставки:* малтитол, течен малтитол, манитол, глицерол, рициново масло, колоиден безводен силиций, магнезиев стеарат, титаниев диоксид (E171), фармацевтичен восък, повидон, жълт хинолинов оцветител (E104).

#### **Какво представляват таблетките за смучене Септолете Д?**

Таблетките за смучене Септолете Д съдържат бензалкониев хлорид, който действа като антисептик-дезинфектант и унищожава много бактерии и някои гъбички. Ментолът и ментоловото етерично масло намаляват чувството за болка и облекчават субективното усещане за парене при прегълъдане; те придават приятен и свеж вкус на таблетките за смучене. Подобно на бензалкониевия хлорид тимолът има антисептично действие и усилива ефекта на лекарствения продукт. Евкалиптовото есенциално масло увеличава секрецията от лигавицата на горните дихателни пътища и така облекчава дишането.

Таблетките за смучене Септолете Д атакуват директно инфекционите причинители, предотвратяват разпространението на инфекцията и ефективно облекчават състоянието при инфекции и възпаления на устата и гърлото.

Таблетките за смучене Септолете Д не съдържат захар, която е благоприятна за бактериалния растеж и поради това не причиняват зъбен кариес.

#### **За какво се използват таблетките за смучене Септолете Д?**

Таблетките за смучене Септолете Д се препоръчват:

- За облекчаване на болката и за дезинфекция при леки инфекции в устната кухина и гърлото;
- при възпаление на лигавицата на устната кухина и венците;
- при дрезгав глас и лош дъх в резултат на инфекции на горните дихателни пътища.



## **Кой не трябва да взема таблетки за смучене Септолете Д?**

Не трябва да вземате таблетки за смучене Септолете Д, ако сте свръхчувствителни (алергични) към някоя от съставките на лекарството.

Деца под 4 годишна възраст.

## **Предпазни мерки и предупреждения**

Таблетките за смучене Септолете Д не се препоръчват за деца под 4-годишна възраст.

Приложението на продукта при кърмачета и малки деца може да доведе до бронхоспазъм и гърчове.

Не се препоръчва употребата на по-високи от предписаните дозировки.

При продължителна пресипналост на гласа се консултирайте с вашия лекар.

Пациентите с диабет не трябва да забравят, че всяка таблетка за смучене съдържа 0.8 g малтитол. За метаболизирането на малтитола е необходим инсулин, но поради бавното хидролизиране и абсорбиране в stomashno-chrevния тракт от него е нужно малко количество.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши – обърнете се към лекар.

## **Таблетки за смучене Септолете Д след храната и напитките**

Не трябва да вземате таблетки за смучене Септолете Д непосредствено преди хранене или с прясно мляко.

## **Бременност и кърмене**

*Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да вземате какъвто и да е лекарствен продукт.*

Бременните жени и кърмачките може да приемат таблетки за смучене само по лекарско предписание. Да се употребява с повишено внимание при кърмачки поради опасността от влизане на досег на кърмачето с продукт, съдържащ ментол и възникване на бронхоспазъм и гърчове.

## **Влияние върху способността за шофиране и работа с машини**

Таблетките за смучене Септолете Д не влияят на способността за шофиране и работа с машини.

## **Кои други лекарствени продукти може да взаимодействат със Септолете Д?**

Моля, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарства.

Лекарствени взаимодействия със Септолете Д не са известни.

## **Специални предупреждения за другите съставки**

Високи дози глицерол може да предизвикат главоболие и stomashno-chrevни разстройства. Таблетките за смучене Септолете Д съдържат полиоли (малтитол, манитол), които в големи дози може да причинят диария, особено при деца.

## **Дозировка и начин на приложение**

Разтваряйте 1 таблетка за смучене в устата си на всеки 2-3 часа.

При деца над 4-годишна възраст се препоръчват до 4 таблетки за смучене на ден, докато при деца над 10-годишна възраст – до 6 таблетки за смучене на ден. На лица в зряла възраст и деца над 12 години се препоръчва да вземат до 8 таблетки за смучене на ден.

*Ако имате впечатление, че действието на лекарството е твърде слабо, посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.*



**Ако примете повече таблетки за смучене Септолете Д, отколкото е нужно**

*Ако сте взели свръхдоза, независимо се консултирайте с вашия лекар или фармацевт.*

Като се има предвид какво е количеството на активните съставки в една таблетка за смучене, възможността за предозиране е минимална. Ако сте погълнали голям брой таблетки за смучене, може да настъпят stomашно-чревни разстройства: гадене, повръщане и диария. При настъпването на такива състояния трябва да спрете да вземате лекарството, да пиете много вода или прясно мляко и да се консултирате с вашия лекар или фармацевт.

**Ако сте забравили да вземете Септолете Д**

Не вземайте двойна доза, за да наваксате пропуснатата.

**Последици след спиране на лечението със Септолете Д**

Няма.

**Възможни нежелани реакции**

*Подобно на другите лекарствени продукти таблетките за смучене Септолете Д може също да дадат нежелани реакции.*

Ако таблетки за смучене Септолете Д се употребяват според предписанията, нежелани реакции може да се проявят много рядко. При чувствителни хора по-високи от предписаните дози може да причинят stomашно-чревни разстройства. Възможни са алергични реакции.

Възможни са появява на бронхоспазъм и гърчове, ако се употребява при малки деца и кърмачета.

*Ако наблюдавате каквато и да е нежелана реакция, дори и тя да не е описана в тази информация за пациента, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.*

**Съхранение и срок на годност**

**Да се съхранява на място, недостъпно за деца.**

Да се съхранява под 25°C. Да се пази от влага и светлина.

*Не употребявайте лекарството след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.*

**Информация за предписване**

Без лекарско предписание.

**Опаковка**

30 таблетки за смучене

**Произведено от**

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

**Редакция**

21 юни 2001

