

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

TROXERUTIN SOPHARMA 2% гел
ТРОКСЕРУТИН СОФАРМА 2% гел
(troxerutin)



Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошат.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка

1. Какво представлява TROXERUTIN SOPHARMA гел и за какво се използва
2. Преди да използвате TROXERUTIN SOPHARMA гел
3. Как да използвате TROXERUTIN SOPHARMA гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на TROXERUTIN SOPHARMA гел
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TROXERUTIN SOPHARMA ГЕЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

TROXERUTIN SOPHARMA гел съдържа активно вещество троксерутин, което принадлежи към група лекарства, наречени капиляротонични. Троксерутин притежава венотонизиращо, противовъзпалително и противооточно действие. Притежава антиоксидантна активност. В резултат на лечението с троксерутин се намалява подуването на краката и свързаните с него симптоми. TROXERUTIN SOPHARMA гел е предназначен за локално симптоматично лечение при хронична венозна недостатъчност; варикозно разширени вени; повърхностен тромбофлебит, перифлебит и флеботромбоза; посттромботичен синдром; посттравматичен оток, хематоми.



2. ПРЕДИ ДА ПРИЛОЖИТЕ TROXERUTIN SOPHARMA ГЕЛ

Не прилагайте TROXERUTIN SOPHARMA гел ако имате:

- Свръхчувствителност към лекарственото или някое от помощните вещества на продукта.

Обърнете специално внимание при лечението с TROXERUTIN SOPHARMA гел. Продължителното прилагане на лекарствения продукт може да доведе до прояви на свръхчувствителност на мястото на приложението.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

При прилагане на TROXERUTIN SOPHARMA гел не са наблюдавани клинично значими лекарствени и други взаимодействия.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

TROXERUTIN SOPHARMA под форма на гел може да се употребява по време на бременност и в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини

TROXERUTIN SOPHARMA гел е лекарствена форма за локално приложение. Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ TROXERUTIN SOPHARMA

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Опитайте се да прилагате лекарството по едно и също време всеки ден.

Гелът се нанася сутрин и вечер, като внимателно се втрива с леки масажни движения върху засегнатите участъци от кожата. Ако е необходимо може да се прилага и под превръзка и стегнат чорап.

Ако сте приложили повече от необходимото количество TROXERUTIN SOPHARMA гел

При локално приложение на продукта малко вероятно да се появи предозиране. При случайно поглъщане на големи количества е необходимо да се приложат общи мерки за елиминиране и провеждане на симптоматично лечение.

Ако сте пропуснали да приложите TROXERUTIN SOPHARMA гел

Ако сте пропуснали да приложите лекарството и приближава времето за следващата доза, приложете я както обикновено. Не използвайте двойно количество от лекарството при следващото приложение.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, TROXERUTIN SOPHARMA гел може да има нежелани реакции. Те обаче не се наблюдават при всички пациенти, така че Вие можете да не получите никаква реакция.

Като правило лекарствения продукт се понася добре.

В редки случаи и при продължителна употреба е възможно зачервяване на кожата и сърбеж.



Ако оплакванията продължават или състоянието Ви се влошава, обърнете се към лекар!

5. СЪХРАНЕНИЕ НА TROXERUTIN SOPHARMA

На защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

След отваряне на тубата гелът може да се използва до 1 месец.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа, TROXERUTIN SOPHARMA гел

В 1 грам гел се съдържа активно вещество троксерутин (*troxerutin*) 20 мг.

Другите съставки са: карбомер 940, динатриев едетат, бензалкониев хлорид, натриев хидроксид, пречистена вода.

Как изглежда TROXERUTIN SOPHARMA гел и какво съдържа опаковката

Жълта желеобразна маса без мирис.

40 грама гел в мембранни алуминиеви туби с капачки от полиетилен, по 1 туба в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД

София 1220, ул. "Илиенско шосе" 16, България

Дата на последно одобрение на листовката
септември 2006

