

МАЛ
СОБСТВЕНО!
09.03.041.

ELOCOM® Дермален разтвор 1mg/g:
ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля прочетете внимателно тази листовка.

Нейното предназначение е да Ви даде информация за **Elocom®**, лекарството, което Вашият лекар ви изписа. В листовката се съдържа необходимата информация, но ако има още нещо което искате да знаете, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Какво е ELOCOM®

Дермалният разтвор съдържа momatsone furoate 0.1% w/w, както и следните неактивни съставки: изопропилов алкохол, пропилен гликол, хидроксипропил целулоза, натриев хидроген фосфат дихидрат, фосфорна киселина, пречистена вода.

Elocom® дермален разтвор е опакован във флакони от по 15 или 30 мл.

Кой е производителя на Elocom?

Schering-Plough Labo N.V.,
Heist-op-den-Berg,
Belgium

Притежателя на разрешението за употреба е:

Schering-Plough Europe,
73 Rue de Stalle
B-1180 Brussels
Belgium

За какво служи Elocom®?

При възрастни и деца, **Elocom®** дермален разтвор е предназначен за да намали зачервяването и сърбежа, причинени от някои кожни заболявания които засягат главата, като псориазис и дерматит.

Кога не трябва да използвате Elocom® дермален разтвор?

- Ако Вие или Вашето дете някога сте проявили алергична реакция към **Elocom®** или друг подобен лекарствен продукт. Вие трябва да уведомите Вашия лекар, за да може да ви бъде предписан друг лекарствен продукт;
- Не прилагайте **Elocom®** ако са налице и други кожни увреждания по скалпа, например при варицела херпес или други. Ако се съмнявате за подобни увреждания, консултирайте се с Вашия лекар.
- Преди употребата на ЕЛОКОМ дермален разтвор Вие трябва да уведомите Вашия лекар, ако сте бременна или кърмите;
- Ако кожа по главата Ви се раздразни или стане чувствителна след употребата на ЕЛОКОМ дермален разтвор, прекратете употребата му и веднага уведомете своя лекар.



Каква е необходимата доза?

Обичайно при възрастни (включително пациенти в напреднала възраст) и деца се препоръчва прилагането на няколко капки от **Elocom**[®] дермален разтвор веднъж дневно върху засегнатата окосмена част на кожата на главата; леко се масажира до пълното пропиване на разтвора от кожата на главата.

Когато използвате **Elocom**[®] дермален разтвор Вие трябва да спазвате следните инструкции:

- **Elocom**[®] дермален разтвор трябва да се използва само върху окосмената част на кожата на главата. **Elocom**[®] дермален разтвор не трябва да се използва върху друга част от тялото.
- **Elocom**[®] дермален разтвор не трябва да се използва върху окосмената част на кожата на главата при деца повече от 5 дни;
- Разтвора не трябва да се прилага в голямо количество и за продължителен период от време (напр. всеки ден в продължение на седмици или месеци);
- Да се внимава **Elocom**[®] дермален разтвор да не попада в очите.
- Ако Вие смятате, че се е появила инфекция върху окосмената част на кожата на главата докато сте използвали **Elocom**[®] дермален разтвор, моля уведомете Вашия лекар, тъй като може да имате нужда от друг тип лекарствен продукт за Вашето лечение.

Как да действате, ако забравите да приложите разтвора?

Ако забравите да използвате ЕЛОКОМ дермален разтвор, приложете го веднага след като си спомните и продължете да го прилагате, както ви е предписал лекаря.

Как да действате ако предозирате разтвора?

Ако Вие (или някой друг) случайно приемете през устата част от ЕЛОКОМ дермален разтвор, това няма да доведе до поява на нежелани лекарствени реакции. Ако все пак се тревожите, обърнете се за съвет към Вашия лекар. Ако използвате ЕЛОКОМ дермален разтвор по-често отколкото трябва, или го прилагате върху голяма повърхност от кожата на главата, това може да повлияе върху някои хормони. При деца може да повлияе върху техния растеж и развитие.

Ако не сте следвали инструкциите за дозиране на ЕЛОКОМ дермален разтвор или предписанието на лекаря си и сте използвали този лекарствен продукт много често и/или продължително време, вие трябва да уведомите Вашия лекар.

Може ли употребата на Elocom[®] да доведе до нежелани реакции?

Някои пациенти могат да установят, че при употреба на **Elocom**[®] могат да се появят следните нежелани реакции: парене, щипене, сърбеж, мравучкане, възпаление на космените фоликули, кожни алергични реакции, обезцветяване



на кожата, прекомерно окосмяване, изтъняване на кожата и появата на червени петна, акне.

Срок на годност

Да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Къде да съхранявате Вашето лекарство?

Разтвора трябва да се съхранява при температура под 25° С. Да се съхранява на места недостъпни за деца.

Последна редакция на текста

Октомври 2003 г.

