

**ИАЛ**  
**ОДОБРЕНО!**  
 ДАТА 29.09.03

Листовка - проект

**ЕСКАЛАР**  
крем 30 г.

**ESCALAR**  
cream 30 g.

**Състав:**

**100 г. крем съдържа:**

***Лекарствени вещества:***

Гъсти екстракти от арника и невен <i>/Arnicae et Calendulae extractum spissum (1:1; 6-9:1)/</i>	2,0 г
--	-------

Сух екстракт от конски кестен <i>/Hippocastani extractum siccum (5-7:1)/</i>	5,0 г.
---	--------

***Помощни вещества:***

течен парафин	2,79 г
глицерил моностеарат	2,79 г
бял вазелин	34,00 г
цетостеарил алкохол	8,87 г
полисорбат 40	6,51 г
миглиол 812	1,86 г
пропилен гликол	4,65 г
безводен силика гел	0,09 г
сорбинова киселина	0,20 г
етил парагидроксибензоат	0,20 г
пречистена вода	до 100,0 г

**Фармакологично действие:**

Екстрактът от конски кестен има противоотечно действие, предпазващо капилярите действие, противотромбино действие.

Екстрактът от невен има противовъзпалително, противоотечно действие, бактерицидно действие слабо имунотронно действие.

Екстрактът от невен има противовъзпалително, antimикробно, слабо имунотронно действие.

**Показания:**

Помощно средство при симптоми на хронична венозна недостатъчност – възпаление на вените на долните крайници, варикозно разширение на вените.

При отичане на краката на хора работещи прави и по време на бременност (но не и през първото тримесечие)

При посттравматични и постоперативни отоци на меките тъкани, при посттравматични увреждания като натъртвания и навяхвания, обширни хематоми. При спортни травми.



**Дозировка и начин на прилагане:**

Само за дермално приложение.

Кремът се нанася с леко втряване върху пострадалото място 2 – 3 пъти дневно.

Да се прилага непрекъснато в продължение на не повече от 2 седмици, при продължително прилагане да се правят прекъсвания. При спортни травми препарата действува най-ефикасно в периода до 30 минути след получаването им.

**Противопоказания:**

Свръхчувствителност към някои от компонентите, особено към Арника.

**Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба:**

Да не се прилага през първите 3 месеца от бременността.

Да не се нанася върху открити рани и при остри възпаления на кожата.

**Лекарствени и други взаимодействия:**

Не са забелязани.

**Бременност и кърмене:**

Да не се прилага през първите 3 месеца от бременността

**Срок на годност - 3 години**

Да не се използва след изтичане срока на годност посочен върху опаковката.

**Специални условия за съхраняване:**

Да се съхранява при температура не по-висока от 25 С на недостъпно за деца място.

**Производител и притежател на разрешението за употреба:**

HASCO-LEK, 242 Zmigrodzka str., 51-131 Wroclaw, Poland

**Дата на последна редакция на текста:**

17.09.2003

