

## СТРЕПСИЛС ПЛЮС

2,4-Дихлорбензил алкохол 1,2 mg / Амилметакрезол 0,6 mg /

Лидокайн хидрохлорид 10 mg Таблетки за смучене

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА

Листовка - Приложение 2

Към РУ №: 11-1244, 10.12.07

Обдобрено: N 7126-11-2007

Лидокайн хидрохлорид 10 mg Lozenges

## STREPSILS® PLUS

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1,2 mg/ Amylmetacresol 0,6 mg /

Lidocaine hydrochloride 10 mg Lozenges

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписане. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### В тази листовка:

1. Какво представлява Стрепсилс Плюс и за какво се използва
2. Преди да приемете Стрепсилс Плюс
3. Как да приемете Стрепсилс Плюс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Стрепсилс Плюс
6. Допълнителна информация

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТРЕПСИЛС ПЛЮС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Стрепсилс плюс е предназначен за самостоятелно симптоматично лечение или в комплексната терапия на инфекциозно-възпалителни заболявания на устната кухина (стоматити, фарингити, ларингити), включително и при острите им форми на инфекции.

Действието се основава на локален анестетик лидокайн, който потиска болката, както и на активните вещества - 2,4 дихлоробензил алкохол и амилметакрезол, които имат антисептично действие и са ефективни срещу широк спектър от бактерии, познати като причинители на възпалителни заболявания в устната кухина и гърлото.

### 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ СТРЕПСИЛС ПЛЮС

Не приемайте Стрепсилс Плюс



- бременност или кърмене
- диабетици и хора с вродена непоносимост към захароза и глюкозен/галактозен синдром. Всяка таблетка съдържа 1g глюкоза и 1,5g захароза.

#### **Обърнете специално внимание при употребата на Стрепсилс Плюс**

- Не се препоръчва при деца под 12 години

#### **Прием на други лекарства**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или щаско сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

#### **Прием на Стрепсилс Плюс с храни и напитки**

Стрепсилс Плюс може да причини временно обезчувствяване в областта на гърлото и устната кухина, поради което лекарственият продукт не трябва да се приема непосредствено преди хранене или поглъщане на топли течности.

#### **Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СТРЕПСИЛС ПЛЮС**

Винаги приемайте Стрепсилс Плюс точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е: възрастни и деца над 12 години – по една таблетка се смуче бавно на всеки 2 часа. Да не се приемат повече от 8 таблетки за 24 часа!

#### **Предупреждение: Да не се превишава посочената доза.**

Ако симптомите не се повлияват или са съпроводени с висока температура или главоболие, консултирайте се с лекар или фармацевт.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Стрепсилс Плюс**

Проблеми с предозиране са малко вероятни, но ако сгрешите и приемете повече таблетки от посочената доза и почувствате загуба на чувствителност в горния храносмилателен тракт, консултирайте се с лекар.

#### **Ако сте пропуснали да приемате Стрепсилс Плюс**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, Стрепсилс Плюс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Възможни нежелани реакции са: инцидентни реакции на свръхчувствителност, изразяващи се чрез обрив, парливо чувство в областта на гърлото и устата, затруднения при прегъщане.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

## 5. КАК ДА СЪХРАНИВАТЕ СТРЕПСИЛС ПЛЮС

Да се съхранява под 30°C.

Не използвайте Стрепсилс Плюс след срока на годност отбелязан на картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

## 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### Какво се съдържа Стрепсилс Плюс

Активните вещества са: 2,4-Дихлорбензил алкохол 1,2 mg, Амилметакрезол 0,6 mg, Лидокайн хидрохлорид 10 mg

Другите съставки са: течна захароза, течна глюкоза, винена киселина, захарин натрий, левоментол, ментово масло, анисоново масло, оцветители E104, E132.

### Как изглежда Стрепсилс Плюс и какво съдържа опаковката

Опаковката Стрепсилс Плюс съдържа 16 таблетки за смучене.

### Притежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.  
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH  
Великобритания

### Производител:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.  
Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB  
Великобритания

Дата на последно одобрение на листовката: ноември 2007.

