

СТРЕПСИС МЕД И ЛИМОН**СТРЕПСИС МЕНТОЛ И ЕВКАЛИПТ****СТРЕПСИС ПОРТОКАЛ С
ВИТАМИН С****СТРЕПСИС КЛАСИК****Всички варианти съдържат активните вещества:**

2,4-Дихлорбензил алкохол 1,2 mg / Амилметакрезол 0,6 mg

Допълнително:

Стрепсис Ментол и Евкалипт съдържа 8 mg Левоментол

Стрепсис Витамин С съдържа 100mg Витамин С

Таблетки за смучене

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №:	11.12.43, 10.12.07
Одобreno: N = 1 / 26 - 11 - 2007	

Strepsils® Honey and Lemon

Strepsils® Menthol and Eucalyptus.

Strepsils® Orange with Vitamin C

Strepsils® Classic

Lozenges

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Тези лекарства се отпускат без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошат или не се подобряват повече от 5 дни при възрастни и повече от 3 дни при деца.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представляват Стрепсилс и за какво се използва
2. Преди да приемете Стрепсилс
3. Как да приемете Стрепсилс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Стрепсилс
6. Допълнителна информация

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СТРЕПСИЛС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ

За самостоятелно симптоматично лечение или в комплексната терапия на инфекциозно-възпалителни заболявания на устната кухина (стоматити, фарингити, ларингити).

Активните вещества 2,4-Дихлорбензил алкохол и Амилметакрезол имат антисептично действие и са ефективни срещу широк спектър от бактерии, познати като причинители на възпалителни заболявания в устната кухина и гърлото.

Ментолът, включен в състава на Стрепсилс Ментол и Евкалипт, има меки анестетични свойства и облекчава назалната конгестия.



Всяка таблетка Стрепсилс Витамин С съдържа 100mg Витамин С, който е особено необходим за организма по време на инфекции.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ СТРЕПСИЛС

Не приемайте Стрепсилс

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на Стрепсилс
- диабетици и хора с вродена непоносимост към захароза и глюкозо/галактозен синдром.

Всяка таблетка Стрепсилс Ментол и Евкалипт и Стрепсилс Класик съдържат: 1g глюкоза и 1,5g захароза.

Всяка таблетка Стрепсилс Мед и Лимон и Стрепсилс Витамин С съдържат: 1g глюкоза и 1,4 g захароза.

Обърнете специално внимание при употребата на Стрепсилс Ментол и Евкалипт

Не се препоръчва при деца под 5 годишна възраст.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СТРЕПСИЛС

Винаги приемайте Стрепсилс точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е: за възрастни и деца – по една таблетка се смуче бавно на всеки 2-3 часа.

Стрепсилс Ментол и Евкалипт е за деца над 5 години.

Помнете: малки деца могат да се задавят.

Предупреждение: Да не се превишава посочената доза.

Ако симптомите не се повлияват или са съпроводени с висока температура или главоболие, консултирайте се с лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Стрепсилс

Предозиране е малко вероятно и би могло само да причини гастроинтестинален дискомфорт.

Ако сте пропуснали да приемете Стрепсилс

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка за смучене.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Стрепсилс могат да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В изключително редки случаи може да се появи кожен обрив, чувство на изтърпване и парене в устата и затруднения при прогълъдане. При поява на някой от тези симптоми е необходимо да уведомите Вашия лекар или фармацевт.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СТРЕПСИЛС

Да се съхраняват под 25°C

Не използвайте Стрепсилс след срока на годност отбелязан на картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво се съдържат Стрепсилс

Стрепсилс Мед и Лимон

Активните вещества са: 2,4-Дихлорбензил алкохол 1,2 mg, Амилметакрезол 0,6 mg
Другите съставки са: мед, винена киселина, ментово масло, лимоново масло, течна захароза, течна глюкоза, оцветител Е104

Стрепсилс Ментол и Евкалипт

Активните вещества са: 2,4-Дихлорбензил алкохол 1,2 mg, Амилметакрезол 0,6 mg,
Ментол 8 mg

Другите съставки са: евкалиптово масло, винена киселина, течна захароза, течна глюкоза, оцветител Е132

Стрепсилс Порткал с Витамин С

Активните вещества са: 2,4-Дихлорбензил алкохол 1,2 mg, Амилметакрезол 0,6 mg,
Витамин С 100 mg.

Другите съставки са: левоментол, винена киселина, анисоново масло, сладко портокалово масло, течна глюкоза, оцветители Е110, Е124

Стрепсилс Класик

Активните вещества са: 2,4-Дихлорбензил алкохол 1,2 mg, Амилметакрезол 0,6 mg
Другите съставки са: левоментол, винена киселина, анисоново масло, ментово масло, течна захароза, течна глюкоза, оцветители Е124, Е122



Как изглеждат Стрепсилс и какво съдържат опаковките

Опаковките Стрепсилс съдържат 24 таблетки за смучене.

Притежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH
Великобритания

Производител:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB
Великобритания

Дата на последно одобрение на листовката: ноември 2007

