



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Espumisan® L

Еспумизан L



Моля, прочетете внимателно следната листовка за пациента, преди да започнете Вашето лечение. За допълнителна информация се обръщайте към Вашия лекар или фармацевт.

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Espumisan® L

Еспумизан L

Какво съдържа Вашето лекарство?

Лекарствено вещество

1 ml (25 капки) от емулсията съдържа 40 mg dimethicone-silicon dioxide 96:4 (simethicone).

Помощни вещества

Полиетиленгликол 1500 моностеарат, глицерол моностеарат, сорбат, хидроксипропилцелулоза, натриев цикламат, захарин натрий, аромат банан, пречистена вода.

Опаковка

Еспумизан L е в стъклена бутилка от 30 ml.

Как действа Еспумизан L?

Еспумизан L е лекарство против подуване и чувство на тежест в корема.

Повишеното образуване и натрупване на газове в стомаха и червата във вид на дребномехурчеста пяна води до неприятни оплаквания, като подуване и чувство на тежест в корема. Това е причина и за колики у кърмачето, които са чести оплаквания и се срещат при около 1/3 от новородените. Коликите започват няколко дни след раждането и продължават до около третия месец. Срещат се както при кърмачета, хранени с майчино мляко, така и при тези, хранени с изкуствено млеко. Коликите обикновено започват по едно и също време на деновонощието, най-често следобед и вечер, с внезапен, силен, продължителен плач. Лицето на детето се зачервява, крачетата се свиват към корема, а ръчичките – в юмручета. Детето е раздразнително, възбудено, неспокойно.

Еспумизан L намалява повърхностното напрежение на мехурчетата газ и разгражда дребномехурчестата пяна. Освободените по този начин газовемогат да се резорбирайт от чревната стена и да се отделят по естествен начин.

Еспумизан L действа по чисто физичен начин, не променя химическите реакции и е фармакологично и физиологично неактивен, не взаимодейства с микроорганизми и с ензими. Еспумизан L не влияе върху храносмилането и не променя киселинността в стомаха. Еспумизан L не се резорбира и се отделя непроменен.

Какво лекува Еспумизан L?

Еспумизан L се прилага:

- при всички заболявания, придружени с повищено образуване и натрупване на газове в stomashno-chrevния тракт (метеоризъм), съпроводени с оплаквания, като дискомфорт, подуване, чувство на тежест и пълнота в областта на корема;
- при колики у кърмачето;



- при прекомерно погълдане на въздух, както и при прием на определени храни и напитки, водещи до повищено образуване на газове (боб, леща, зеле, газирани напитки);
- при сърдечни оплаквания, в резултат от придвижване на диафрагмата нагоре вследствие натрупване на газове в стомашно-чревния тракт;
- при подготовка на коремната кухина за образно изследване (рентгеново, ултразвуково и т.н.) и като добавка към контрастна материя при двойно-контрастна рентгенография;
- при отравяне с детергенти (тензиди)

Кога не трябва да се прилага *Еспумизан L*?

Еспумизан L не трябва да се прилага при пациенти със свръхчувствителност към лекарственото вещество simethicone или към някое от помощните вещества на лекарството.

Какви взаимодействия може да има между *Еспумизан L* и други лекарства, които приемате?

Няма известни взаимодействия с други лекарства.

Може ли да се прилага *Еспумизан L* по време на бременност и кърмене?

Няма основания да се избяга приложението на *Еспумизан L* по време на бременност и кърмене.

Повлиява ли *Еспумизан L* способността за шофиране и работа с машини?

Еспумизан L не променя времето за реакция и не нарушава способността за шофиране и работа с машини.

Как и колко време трябва да се приема *Еспумизан L*?

При подуване и чувство на тежест в корема, при колики у кърмачето

Кърмачета

1 ml (еквивалентен на 25 капки) *Еспумизан L* се прибавя в шишето с мляко при всяко хранене или с малка лъжичка се дава на кърмачето преди или след всяко кърмене.

Деца между 1 и 6 години

1 ml (еквивалентен на 25 капки) *Еспумизан L*, 3 до 5 пъти дневно.

Деца между 6 и 14 години

1-2 ml (еквивалентни на 25-50 капки) *Еспумизан L*, 3 до 5 пъти дневно.

Юноши и възрастни:

2 ml (еквивалентни на 50 капки) *Еспумизан L*, 3 до 5 пъти дневно.

Еспумизан L се приема по време хранене или след хранене, а при необходимост и преди лягане.

Продължителността на лечението се определя от протичането на оплакванията. Ако е необходимо, *Еспумизан L* може да се приема продължително време.



При подготовка на коремната кухина за образно изследване

2 ml (еквивалентни на 50 капки) Еспумизан L, 3 пъти дневно в деня преди изследването и 2 ml Еспумизан L, сутринта в деня на изследване, освен ако лекарят не е препоръчал друго.

Като добавка към контрастна материя при образно изследване

4 до 8 ml (еквивалентни на 100 до 200 капки) Еспумизан L към 1 литър от контрастната материя за двойно контрастна рентгенография.

Като противоотрова при интоксикация с детергенти (отравяне с тензиди)

Дозировката се определя от тежестта на отравянето.

Деца

2.5 до 10 ml (от 65 капки до 1/3 от съдържанието на бутилката) Еспумизан L.

Възрастни

10 до 20 ml (от 1/3 до 2/3 от съдържанието на бутилката) от Еспумизан L.

Забележка

Преди употреба разклатете добре бутилката с Еспумизан L. За да дозирате, дръжте бутилката с дъното нагоре.

Еспумизан L може да се прилага и след операции.

Еспумизан L не съдържа захар и поради това е подходящ за диабетици и хора с нарушен храносмилане.

Какво трябва да се направи в случай на предозиране с Еспумизан L?

Лекарственото вещество на Еспумизан L води до разпадане на мехурчетата газ в стомашно-чревния тракт по напълно физичен начин, като е напълно химически и биологично неактивен. Поради това на практика отравяне може да се изключи. Приложението на големи дози Еспумизан L също се понася без проблеми.

Какви нежелани лекарствени реакции може да причини Еспумизан L?

Досега не са наблюдавани нежелани лекарствени реакции при приложение на Еспумизан L (вж. "Кога не трябва да се прилага Еспумизан L?")

Как да съхранявате Еспумизан L?

Няма специални условия за съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

3 години.

Срок на годност след първо отваряне на опаковката – 4 седмици.

Да не се използва след срока на годност, обозначен на опаковката!

Дата на последната редакция на листовката

Юни, 2004 год.

Кой произвежда Еспумизан L?


BERLIN-CHEMIE
MENARINI GROUP

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Germany

