

Към РУ №: 11-1660 / 04.03.08

Одобрено: N=1125-02-2008

Одобрено:

Информация за потребител**X-Prep®**
Х-ПРЕП

75 мл перорален разтвор

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви въпроси, попитайте Вашия лекар, или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора.

То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар, или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява X-Преп® и за какво се използва
2. Преди да приемете X-Преп®
3. Как да приемате X-Преп®
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате X-Преп®
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява X-Преп® и за какво се използва

X-Преп® е разтвор за приемане през устата и се използва за пълно прочистване на дебелото черво преди рентгенови прегледи и други диагностични изследвания, в случай че не е постигнат достатъчен ефект само с електролитни разтвори или тяхното прилагане е невъзможно.

2. Преди да приемете X-Преп®

Не приемайте X-Преп® ако сте алергични към активното вещество, или към някоя от останалите съставки. Не трябва да използвате X-Преп® при непроходимост на червата, при коремна болка от неизвестен произход, при хронични изострени възпалителни заболявания или апендицит, при тежко обезводняване със загуба на течности и електролити; при кърмачета, тъй като след прием на високи дози слабителни, съдържащи антраноид, са наблюдавани зачерявяне и обрив по хълбоците; при бременност и кърмене.

При хронични изострени възпалителни заболявания или апендицит, както и при деца под 10 годишна възраст, които не са кърмачета, X-Преп® може да се използва само след консултация с лекар.

X-Преп не трябва да се използва при кърмачета. Пациентите в напреднала възраст трябва да приемат вода в големи количества при прилагане на X-Преп.

Специално внимание трябва да се обрне при прилагането на пациенти с неспособност за задържане на урина и изпражнения. Да се избяга



продължителен контакт между кожата и изпражненията, като често се сменят пелените след приемане на X-Преп®.

Пациенти в напреднала възраст, пациенти с астения и тегло под нормата и пациенти с лабилно кръвообращение са рискови по отношение на колапс поради загуба на течности. Тези пациенти трябва да приемат големи количества вода (вж. „Дозировка“).

Прием на други лекарства

Кои лекарства влияят върху действието на X-Преп®

При едновременно лечение с дигиталисови препарати, ефектът на сърдечните гликозиди може да бъде засилен поради недостиг на калий.

Действието на кои други лекарства може да бъде повлияно от X-Преп®

Ефектът на други едновременно използвани лекарства може да бъде намален поради намаленото време на престой в червата.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насокор сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецептa.

Прием с хrани и напитки

След приемане на X-Преп® не трябва да пияте мляко.

Бременност и кърмене

При бременност и кърмене X-Преп® не трябва да се използва.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Поради алкохолното съдържание на X-Преп® е възможно нарушение на реакциите.

Важна информация за някои от съставките на X-Преп®

Лекарственият продукт съдържа 2.75 обемни % алкохол. При спазване на указанията за дозиране при всяка доза (съдържанието на 1 бутилка) се приемат до 1.65 г алкохол. Това представлява известен риск при пациенти с чернодробни заболявания, алкохолици, епилептици, пациенти с мозъчни увреждания, бременни, кърмещи жени и деца.

Информация за диабетиците: 1 бутилка съдържа 4.16 хлебни единици.

3. Как да приемате X-Преп®

Винаги приемайте X-Преп® точно както Ви е казал Вашият лекар.
Спазването на указанията е важно, тъй като в противен случай X-Преп® няма необходимия ефект. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В какви количества и кога трябва да използвате X-Преп®

В деня преди изследването

Сутрин - обичайна закуска.

На обяд трябва да се приеме течна храна, например бистър бульон, чай или кафе.



В 14 часа след обед се приема съдържанието на 1 бутилка с голяма чаша течност (вода или чай). Не трябва да се пие мляко!

Дозата (максимална дозировка) не трябва да надвишава 150 mg хидроксиантраценови деривати, еквивалентни на 75 ml разтвор X-Преп® (= 1 бутилка).

При деца над 3 години и при възрастни с тегло под нормата препоръчваната доза е 1 ml X-Преп® на кг телесно тегло.

След приема на X-Преп® на всеки час до времето за лягане трябва да се изпива по една голяма чаша течност (общо 2-3 литра). До завършване на изследването не трябва да се приема храна.

Изпразването на дебелото черво става 5 до 8 часа след приемане на X-Преп®. При кърмачета, малки деца и пациенти в напреднала възраст, както и при пациенти с астения и тегло под нормата, трябва да се обърне голямо внимание на приемането на достатъчно течности. Не са необходими специални диетични мерки.

В деня на изследването

Да не се закусва. Позволени са само негазирани напитки. Преди рентгенови изследвания на бъбреците (пиелографии) в деня на изследването не трябва да се пият течности.

Колко дълго трябва да използвате X-Преп®

Лекарственият продукт е предписан за еднократна употреба.

Ако сте приели повече от необходимата доза X-Преп®

В случай на предозиране потърсете незабавно лекарска помощ.

Признаките на предозиране са диария, загуба на течности и електролити и риск от колабиране.

Необходимите мерки включват възстановяване на водно-електролитния баланс, ако е необходимо лечение на шока и елиминиране на токсините.

3. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Възможни са колики, гадене и повръщане. При пациенти в напреднала възраст, с астения и тегло под нормата, както и при пациенти с лабилно кръвообращение не може да бъде изключен рисък от колапс поради обезводняване. Може за бъде утежнен съществуващ недостиг на електролити. В много редки случаи може да се наблюдава свръхчувствителност, проявяваща се с кожни реакции (уртикария), а в единични случаи затруднено дишане и/или спадане на кръвното налягане.

Възможно е леко червено оцветяване на урината, което е без клинично значение.

Какви мерки трябва да предприемете

За предотвратяване на колапс трябва да се приемат големи количества течности.

5. Как да съхранявате X-Преп®



Съхранявайте при температура под 25°C.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа X-Преп®

Активното вещество е:

1 бутилка X-Преп® перорален разтвор (75 мл) съдържа: сух екстракт от плодовете на Александрийска сена 1.92 - 2.76 г, стандартизиран по съдържание на хидроксиантрацен гликозид, изчислен като сенозид В 150 мг.

Другите съставки са: етанол, захароза, калиев сорбат като консервант, дестилирана вода, ароматизатори, малтодекстрин.

1 бутилка съдържа 2.75 обемни % алкохол.

1 бутилка съдържа 4.16 хлебни единици.

Как изглежда X-Prep® и какво съдържа опаковката

Разтвор за приемане през устата в бутилка от 75 мл.

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

Производител

MUNDIPHARMA GmbH

65549 Limburg (Lahn)

Германия

Притежател на разрешението за употреба

Mundipharma Ges.m.b.H.

Apollogasse 16-18

1072 Wien

Австрия

Дата на последно одобрение на листовката

Февруари 2008

