



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

FERRO SANOL® DUO / ФЕРО САНОЛ ДУО

Прочетете внимателно тази листовка преди употребата на медикамента

- Запазете тази листовка, тъй като може да Ви се наложи да направите справка с нея в бъдеще.
- В случай, че имате въпроси или се нуждаете от съвет, обърнете се към Вашия фармацевт.
- Трябва да отидете на лекар ако симптомите Ви се влошат или ако не се наблюдава подобрение.

Съдържание на тази листовка:

1. Какво е ferro sanol® duo и за какво се използва
2. Преди да започнете употребата на ferro sanol ® duo
3. Как да приемате ferro sanol ® duo
4. Възможни странични ефекти
5. Съхранение на ferro sanol ® duo

Лекарствено вещество :

железен (II)-глицин-сулфат комплекс 567.7 мг (еквивалентно на 100 мг Fe²⁺)

Други съставки:

Аскорбинова киселина (E300), метилхидроксипропилцелулоза (E464), хидроксипропилцелулоза (E463), натриев додецил сулфат, полисорбат 80, О-ацетилтриетил цитрат, талк, желатин, микрокристална целулоза (E460a), поли[(акрилна киселина, метакрилна киселина)(етилметилакрилат, метакрилат)] (1:1), Оцветители: E 171, E 172

Притежател на разрешението за употреба:

Schwarz Pharma AG
Alfred-Nobel-Str. 10
40789 Monheim
Federal Republic of Germany

1. Какво е ferro sanol ® duo и за какво се използва

ferro sanol® duo е препарат за перорален прием на желязо под формата на твърди капсули, съдържащи стомашно-устойчиви гранули.

Капсулите са запечатани в блистери и опаковани в картонени кутии, съдържащи 50 или 100 капсули.

Капсулите ferro sanol® duo набавят желязо в случай на недостиг на желязо в организма.

2. Преди да започнете употребата на ferro sanol® duo

ferro sanol® duo не бива да се приема в следните случаи:

- свръхчувствителност към някоя от съставките на ferro sanol® duo
- езофагеална стриктура (стеснение на хранопровода)
- деца под 6 годишна възраст не трябва да приемат ferro sanol® duo

Към приема на ferro sanol® duo трябва да се подходи с особено внимание:

Особено ако сте на възраст над 60 години източникът на кръвозагуба или загуба на желязо трябва да бъде изследван много внимателно.

Трябва да бъдете особено внимателни ако страдате от чревни язви.

Ferro sanol® duo в комбинация с еритропоедин:

Ако страдате от дефицит на еритропоедин (ензим, произвеждан в бъбреците) вследствие на сериозно бъбречно заболяване, Вие трябва да приемате ferro sanol® duo.

Консултирайте се с Вашия лекар дори и ако горната информация в момента не Ви касае, но е била валидна за Вас в някакъв минал момент.

Бременност и кърмене

Не е известен някакъв риск за бременността или периода на кърмене.

Употреба на други лекарства

Уведомете Вашия лекар или фармацевт ако употребявате или ако доскоро сте употребявали някакво друго лекарство, включително и такова, което Ви е предписано. Забележете, че това се отнася и до продукти, използвани преди време или които ще се използват в бъдеще.

Какви други лекарства могат да повлияят върху ефекта от ferro sanol® duo?

Когато ferro sanol® duo се приема заедно с антибиотици от групата на тетрациклините се инхибира както абсорбцията на тетрациклините, така и абсорбцията на желязото.

Едновременният прием на холестирамин и антиациди (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+} соли) потиска абсорбцията на желязото. Раздразването на лигавицата на червата може да се усили от пероралния прием на салицилати, фенилбутазон и оксифенбутазон.

Как ferro sanol® duo влияе върху действието на други лекарства?

Пенициламин, орално приемани златни съединения и тетрациклини се абсорбират по-слабо, когато се приемат едновременно с желязо.

Какви храни и напитки трябва да избягвате?

Абсорбцията на желязо се потиска от напитки като кафе, чай и мляко и от някои съставки в храната, които присъстват в различни количества в зърнените храни и зеленчуците. Следователно, ако е възможно, ferro sanol® duo не трябва да се приема заедно с храна, а около 2 часа преди или след хранене.

3. Как да приемате ferro sanol® duo

Какво количество ferro sanol® duo трябва да приемате и колко често?

Възрастни и деца над 6 години трябва да приемат по една капсула дневно. При ясно изразен дефицит на желязо у възрастни и подрастващи над 15 години или с над 50 kg телесно тегло може да се назначи 2-3 пъти по-висока доза в началото на лечението.

Как се прилага ferro sanol® duo ?

Приемайте капсулите ferro sanol® duo с достатъчно количество вода, без да ги дъвчете. Приемайте ги или на празен стомах сутрин (около 1 час преди закуска) или на достатъчен интервал (около 2 часа) преди или след хранене.

Забележка: Ако поглъщането на капсулата е свързано с трудности или не е желателно, съдържанието ѝ може да се приеме и без тялото на капсулата. За да направите това, внимателно изсипете съдържанието на капсулата - 300-400 микрогранули - в една супена лъжица. След като глътнете микрогранулите, изпийте достатъчно количество вода.

Колко дълго трябва да приемате ferro sanol® duo?

Вашият лекар ще определи продължителността на приемане на препарата въз основа на лабораторните изследвания. Това може да отнеме от 3 до 6 месеца, в зависимост от сериозността на анемията и индивидуалното състояние, като в отделни случаи терапията може да продължи и по-дълго.

Ако Ви се струва, че ефектът на ferro sanol ® duo е твърде силен или твърде слаб, не променяйте дозата по Ваше усмотрение, а се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако приемете повече капсули ferro sanol ® duo от определеното

В случай че приемете повече капсули ferro sanol ® duo от предписаното, веднага се консултирайте с лекар или фармацевт.

Ако сте забравите да приемете капсулите ferro sanol ® duo

· Не приемайте двойна доза, за да компенсирате забравените отделни дози.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, ferro sanol ® duo може да има нежелани реакции.

Незабавно съобщете на своя лекар, ако забележите някои от следните реакции:

- Стомашно-чревни смущения като диария, запек, стомашни киселини или повръщане
- Реакции на свръхчувствителност (например кожни реакции), които могат да се появят в редки случаи

Уведомете лекаря си, ако забележите оцветяване на изпражненията в тъмен цвят, което може да се получи по време на лечението в резултат на съдържачото се в препаратата желязо, въпреки че такова оцветяване е безопасно.

Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, моля, уведомете своя лекар или фармацевт.

5. Съхранение на ferro sanol ® duo

Пазете ferro sanol®duo на недостъпно за деца място.

Не съхранявайте ferro sanol ® duo при температури над 25°C.

Препаратът не трябва да се употребява след изтичане на срока на годност, отпечатан върху опаковката!

В случай че имате някакви въпроси, моля, обърнете се към своя лекар или фармацевт.

Последна редакция: юли 2001г.