

ИАЛ
ОДОБРЕН
ДАТ. 13.07.09

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, внимателно прочетете тази листовка защото тя съдържа важна за Вас информация:

Това лекарство е без рецепт. Независимо от това Halixol трябва да се приема правилно за да получите възможно най-добрите резултати.

- Пазете тази листовка, може да се наложи да я прочетете отново
- Ако възникнат допълнителни въпроси, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт
- Ако състоянието Ви се влоши или ако не се подобри след 3 дневно лечение, трябва да се консултирате с Вашия лекар

Съдържание на листовката:

1. Какво представлява Halixol и за какво се използва
2. Преди да започнете да приемате Halixol
3. Как да приемате Halixol
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхраняване на лекарството
6. Друга информация

HALIXOL® syrup

**300 mg ambroxol in 100 ml syrup
(5 ml syrup contains 15 mg ambroxol)**

ХАЛИКСОЛ сироп

**300 mg ambroxol в 100 ml сироп
(5 ml сироп съдържат 15 mg ambroxol)**

Лекарственото вещество е ambroxol. Като помощни вещества се съдържат още натриев цитрат, натриев бензоат, бананов и ягодов аромат, натриев цикламат, монохидрат на лимонената киселина, повидон, сорбитол, дестилирана вода.

Притежател на разрешението за употреба:

**EGIS PHARMACEUTICALS LTD.
Keresturi ut 30-38.
1106 BUDAPEST, HUNGARY
Phone: (36-1) 265-5555
Fax: (36-1) 265-5529**

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХАЛИКСОЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Лекарственото вещество на Халиксол сироп, ambroxol, принадлежи към т. нар. секретолитици (вещества, които втечняват бронхиалния секрет).

Той се използва за втечняване на гъстия бронхиален секрет при остри и обострени хронични заболявания на бронхите, които се съпътстват от увеличена бронхиална секреция и нарушен движение на този секрет, а също и за втечняване на бронхиалния секрет при възпалителни заболявания в областта на носогълътката.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ХАЛИКСОЛ

Не приемайте Халиксол сироп:

- ако сте алергични към лекарственото вещество ambroxol или към бромхексин, или към някое от помощните вещества.
- ако имате язвено заболяване на stomашно-чревния път.
- ако сте бременна или кърмите.
- в случай на наследствена фруктозна непоносимост (5 ml сироп съдържат 1,2 g сорбитол; виж също "По-специално внимание трябва да се обърне на"

По-специално внимание трябва да се обърне на:

- Ако оплакванията продължават или няма подобрене, въпреки лечението с ambroxol, Вие трябва да се консултирате с Вашия лекар.
- Тежки бъбречни увреждания могат да бъдат свързани с удълженото време на полуелиминиране на ambroxol (виж. Точка 3)
- Лекарството може да бъде използвано, но с изключително внимание в случаи на увреждане на бронхиалната моторика или при отделяне на големи количества бронхиален секрет дължащо се на състояние на запушване на бронхите от секрета.
- Този продукт съдържа сорбитол като помощно вещество и когато се прилага според препоръките за дозиране, всяка доза набавя 1,2 g сорбитол.

Неподходящ при вродена непоносимост към фруктоза. Лекарството може да причини stomашно дразнене и диария

Как други лекарства могат да повлияят Вашето лечение с Халиксол
Лекарства за кашлица, такива като кодеин не трябва да бъдат приемани заедно с Халиксол сироп, защото разтвореният бронхиален секрет не се отхрачва напълно, тъй като кодеин потиска кашлицата.

Комбинацията на Халиксол с някои антибиотици (амоксицилин, цефуроксим, еритромицин, доксициклин) може да бъде от полза, защото Халиксол увеличава проникването им в бронхиалния секрет.

Бременност и кърмене

Употребата на Халиксол е противопоказана по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Няма данни, които доказват дали Вашите способности да шофирате и работите с машини са влошени.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ХАЛИКСОЛ

Обичайната доза е:

При възрастни:

Обичайната доза в първите 2 – 3 дни на лечение е 10 ml сироп 3 пъти дневно. През следващите дни 10 ml сироп 2 пъти дневно или 5 ml сироп 3 пъти дневно.

При деца:

Под 2 годишна възраст: 2,5 ml сироп 2 пъти дневно.

От 2 до 6 години: 2,5 ml сироп 3 пъти дневно.

От 6 до 12 години: 5 ml сироп 2 или 3 пъти дневно.

Сиропът се предлага с мерителна чашка с обем 5 ml и мерителни деления.

Лекарството трябва да се приема след нахранване с голямо количество течност. Последната увеличава ефекта на втечняване на бронхиалния секрет на amroxol.

Дозата трябва да бъде намалена или интервала между отделните приеми увеличен в случай, че страдате от *тежка бъбречна недостатъчност*.

АКО приемете повече сироп от необходимото

Възможните признания на остро предозиране са гадене, повръщане, диария и други стомашно-чревни нарушения.

Лечение на предозирането:

Прилагане на лекарства за повръщане, а също и приемане на течности, такива като мляко или чай, трябва да се направи веднага в случай на предозиране. Стомашна промивка може да бъде направена в първите 1 – 2 часа след предозирането. Необходимо е непрекъснато следене на състоянието на сърдечно-съдовата система.

Ако пропуснете прием:

Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза(и) поради опасност от предозиране.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Подобно на всички лекарства Халиксол може да причини нежелани реакции. Ако някоя от долу изброените се прояви, спрете приемането на Халиксол и информирайте незабавно Вашия лекар или се обърнете към най-близкото звено за Спешна медицинска помощ:

- Подуване на устните или гърлото, което причинява затруднено дишане или прегълъщане;
- Припадък

Тези нежелани реакции са много сериозни, но настъпват рядко. Ако все пак настъпят това е признак за сериозна алергична реакция към Халиксол, което може да наложи медицинска намеса или приемане в болница.

- Уртикария

Признак на алергична реакция може да бъде и появата на уртикария. Веднага спрете приемането на лекарството, уведомете лекуващия лекар и се осведомете как да продължите лечението си. Ако обривите са обширни и са по цялото тяло, свържете се незабавно с Вашия лекар за да не се стигне до сериозни последици.

Гореспоменатите нежелани реакции се проявяват изключително рядко.

Не всички посочени по-долу нежелани реакции се проявяват при пациентите, приемащи това лекарство. Възможно е появата на следните по време на лечение с Халиксол:

Не често слабост, главоболие, диария, повръщане, stomашно-чревни оплаквания, кожни обриви.

Сироп може да има лек слабителен ефект поради съдържанието на сорбитол.

Ако забележите нежелана реакция, неописана в тази листовка моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ХАЛИКСОЛ СИРОП

Да се пази на недостъпно за деца място.

Да се съхранява под 25°C. Да не се замразява. Да се пази от светлина.

Не употребявайте лекарството след срока на годност, посочен върху опаковката.

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на изготвяне на настоящата листовка: Март 2004 г.