



УКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБА

GLAUMOL (ГЛАУМОЛ)

Капки за очи.

Състав: *Лекарствено вещество:*

Timolol maleate 6.8 mg (еквивалентен на 5 mg timolol) в 1 ml разтвор

Помощни вещества:

Sodium phosphate monobasic; sodium phosphate dibasic; benzalkonium chloride; water for injection.

Индикационна група: Очни препарати, антиглаукомни препарати

Характеристики: Тимолол е неспецифичен бета-блокер. След прилагане в окото той намалява вътреочното налягане най-вече чрез намалено образуване на течност във воднистото тяло и в по-малка степен на умерено увеличаване на нейния поток. Тимолол не повлиява съществено акомодацията или размера на зеницата.

Увеличаването на вискозитета на препарата чрез добавянето на фармакологично индеферентно вещество – хипромелоза, удължава престоят на тимолол в окото, а така също намалява очното дразнене. Удълженият контакт на очните капки с повърхността на окото улеснява абсорбцията на лекарственото вещество, което се отразява положително на продължителността на ефекта.

Показания: Glaumol се използва за лечение на случаи с повищено вътреочно налягане. На първо място откритогъльна глаукома, глаукома вследствие отстраняване на очната корnea (афакия), при някои случаи на вторична глаукома, при случаи на глаукома неподаващи се на друга терапия. Препаратът може да се използува при възрастни, младежи и деца по-възрастни от 8 години.

Лечението на деца на възраст от 1 до 8 години може да стане само след преценка от детски офтальмолог и цялото лечение да протече под негово наблюдение.

Противопоказания: Glaumol не трябва да се прилага при следните случаи:

- Свръхчувствителност към лекарственото вещество или някои други компоненти на продукта.
- Дистрофични промени в корнеята (дефекти в храненето на корнеята).
- Бронхиална свръхактивност
- Бронхиална астма (даже само при наличие на анамнестични данни за такава).
- Хроничен възпалителен бронхообструктивен синдром

- При някои сърдечни заболявания, специално на сърдечния ритъм (например синусова брадикардия, атриовентрикуларен блок II и III степен).
- при деца под една годишна възраст.

Прилагането на продукта на деца на възраст от една до осъм години, а така също на бременни и кърмещи жени трябва да става само при наличието на много сериозни основания.

Повишени грижи се изискват при пациенти страдащи от нестабилен диабет или такива с намалено ниво на кръвната захар.

Ако от някои от симптомите описани тук отговарят на Вашето състояние или се появят по време на лечението с Glaumol, моля, консултирайте се с Вашия лекар.

Нежелани реакции: Glaumolce понася добре. Много рядко могат да се наблюдават признания на раздразване на окото, като възпаление на конконктивата, корнеята, клепачите или други дефекти в зрението (като двойно зрение). Общи странични реакции се наблюдават много рядко. По специално при пациенти страдащи от сърдечносъдови заболявания могат да се появят брадикардия или аритмия, хипотония или сърдечна недостатъчност. При пациенти предразположени към спастични реакции на бронхите могат да се наблюдават дихателна недостатъчност или бронхоспазъм и диспнея. Като резултат на повлияване на ЦНС понякога се наблюдават депресия, главоболие, чувство на слабост, световъртеж. При болни от язвена болест на стомаха може да се наблюдава активиране на заболяването.

При появата на така описаните нежелани реакции или на други необикновени такива, незабавно спрете приемането на препарата и без забавяне се консултирате с Вашия лекар.

Взаимодействия: Ефектите на Glaumol е възможно да взаимодействуват с тези на други едновременно приети препарати. Затова Вашият лекар трябва да бъде информиран за всички медикаменти, които Вие приемате в момента, сте взимали в миналото или планирате да взимате, с или без рецепт.

За Вашия лекар е важно да знае дали Вие взимате медикаменти за понижаване на кръвното налягане или за лечение на сърцето.

Ако се лекувате с други очни препарати, консултирайте се с офтالмолог за възможността от тяхното съвместно приемане. По принцип, ние препоръчваме да се спазва най-малко 5 минутен интервал на прилагане между другия препарат и Glaumol.

Взаимодействия: Ефектите на Glaumol е възможно да взаимодействуват с тези на други едновременно приети препарати. Затова Вашият лекар трябва да бъде информиран за всички медикаменти, които Вие приемате в момента, сте взимали в миналото или планирате да взимате, с или без рецепт.

За Вашия лекар е важно да знае дали Вие взимате медикаменти за понижаване на кръвното налягане или за лечение на сърцето.

Ако се лекувате с други очни препарати, консултирайте се с офталмолог за възможността от тяхното съвместно приемане. По принцип, ние

препоръчваме да се спазва най-малко 5 минутен интервал на прилагане между другия препарат и Glaumol.

Специални предупреждения: По време на лечението с Glaumol Вие ще трябва да посещавате Вашия офтальмолог за редовни прегледи по схема определена от него. Ако по невнимание пропуснете да приемете една доза, приемете я незабавно след ~~това~~ открите това, но без да увеличавате следващата доза.

Препаратът може да намали остротата на зрението, така че повлиява неблагоприятно възможността за реагиране при управление на моторни превозни средства, машини или при извършване на други рискови дейности, изискващи повишено внимание.

По време на лечението не трябва да носите меки контактни лещи, а при възможност и твърди контактни лещи. При случаи където това е невъзможно, твърдите контактни лещи се свалят преди прилагането на медикамента и се слагат отново най-рано след 20 минути.

При спазване на предписаната дозировка и време на прилагане е невъзможно свръхдозиране. Признаките на свръхдозиране са следните: намаляване на сърдечната честота, намаляване на кръвното налягане, появата на смущения в дишането, астма, смущения в съзнанието и спазми. Ако препаратът по невнимание се погълне целия незабавно потърсете медицинска помощ.

Предупреждение: Препаратът не трябва да се употребява след срока на годност означен на опаковката. Отворената опаковка трябва да се употреби за един месец. След всяко прилагане, затворете незабавно шишето. Да се държи далеч от деца!

Съхранение: Съхранява се при температура под 25°C, далеч от пряко осветяване.

Срок на годност: 3 (три) години. След отваряне на контейнера съдържанието трябва да се употреби до 4 седмици.

Опаковка

Шице от безцветно стъкло. Едно шице съдържа 5 мл 0.5% разтвор на ТИМОЛОЛ.

Само по лекарско предписание!

Производител

GALENIKA a.d.

Batajnicky drum b.b.

11 080 Zemun-Belgrade, Yugoslavia

tel/fax: +38111612172

Дата на последна редакция: 07.12.1999