


## Kamistad® - Gel, oromucosal gel Камистад-Гел, гел за устна лигавица



Състав: 1 g Камистад съдържа:

Активни вещества: lidocaine hydrochloride monohydrate 20 mg, thymol 1 mg, tincture of chamomile flowers (1:5,5) 200 mg.

Помощни вещества: бензалкониев хлорид 1 mg, карбомери 15 mg, захарин-натрий.2H<sub>2</sub>O 1 mg, трометамол 28.1 mg, пречистена вода 731.9 mg, канелено масло 1 mg.

Опаковка:

Оригиналната опаковка съдържа туба с 10 g гел

Лекарствена форма: гел срещу възпаления за приложение върху устните и устната лигавица.

**Показания:** Болезнени възпаления на устната лигавица и устните, включително и при наличие на межурчета, гингивит (възпаление на венците) и ледена еритема (изгаряне на устните от студ). За втриване във венците и небцето за облекчаване на болезненост, свърхчувствителност и/или възпаление на лигавицата, дължащи се на зъбни апарати (протези, шини). За предотвратяване на болка и дискомфорт, свързани с никнене на мъдреци. За облекчаване на болезненост и дискомфорт, свързани с ортодонтски процедури.

**Противопоказания:**

При свръхчувствителност към лидокаин или други локални анестетици от амиден тип, към лайка или някоя от другите съставки.

**Какво трябва да знаете за употребата при деца?**

За бебета и малки деца не трябва да се употребява повече от 3 пъти за 24 часа лента от ½ см гел Камистад.

**Какво трябва да имате предвид ако сте бременна или кърмачка?**

Безопасността на Камистад при бременни жени и кърмачки не е доказана. Поради това лекарството не трябва да се използва през тези периоди.

**Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.**

Няма

**Дозировка и начин на приложение:** Инструкциите, дадени по-долу, се прилагат ако лекарят не е предписал друго. Моля, придържайте се към тях и/или тези, дадени ви от лекаря за ефективно и безопасно лечение с Камистад.

**По колко и колко често трябва да използвате Камистад?**

Моля, прилагайте лента от Камистад-Гел по около 0,5 см 3 пъти дневно.

**Как и колко време трябва да използвате Камистад?**

За лечение на венците и дискомфорт, дължащ се на зъбни протези, се прилага на болезнените или възпалени места, като леко се масажира.

Проблеми при никнене на зъби при бебета и малки деца

За бебета и малки деца не трябва да се употребява повече от 3 пъти за 24 часа лента от ½ см гел Камистад.

Камистад трябва да се използва до отзучаване на симптомите. Високи дозировки за поддълъг период от време не трябва да се използват без съгласието на лекар.

**Предозиране и други грешки:**

Няма съобщения за предозиране на Камистад.

При предозиране, дължащо се на нарушаване на инструкциите за употреба, вашият лекар ще ви предложи лечение според симптомите.

**Нежелани лекарствени реакции:**

**Какви нежелани реакции може да се проявят при употреба на Камистад?**

В редки случаи след прилагане на гела може да настъпи леко чувство на парене и изтръпване.

Ако се появят някои нежелани реакции, неописани в тази листовка, моля информирайте непременно вашия лекар или фармацевт.

**Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба**

Камистад гел не трябва да се прилага продължително време във високи дози.

Да не се прилага при наличие на големи пресни рани в устната кухина.

**Взаимодействия с други медикаменти и други форми на взаимодействие**

Няма известни досега.

**Срок на годност:**

Срокът на годност е отпечатан върху опаковката и тубата.

Да не се употребява след тази дата!

Да се съхранява при температура под +25° С.

**Да се съхранява на места, недостъпни за деца!**

---

Регистрационен номер:

Притежател на разрешението за употреба:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany

Последна редакция на информацията: октомври 2000 г