

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

NYSTATIN F

НИСТАТИН F

СЪСТАВ:

Активни вещества в един песарий: Nystatin 250 000 IU ; Furazolidone 5 mg;
Помощно вещество: витепсол.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Песарии, по 10 броя в опаковка.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

"Балканфарма-Разград"-АД
бул."Априлско въстание" 68
Разград-7200

ДЕЙСТВИЕ

Нистатин F песарии е комбинация от *нистатин* – полиенов антибиотик, който спира развитието на микотичната инфекция в ниски и унищожава микроорганизмите във високи концентрации и *фуразолидон* – синтетичен нитрофуран, който унищожава микроорганизмите от рода *Trichomonas*.

ПОКАЗАНИЯ

Нистатин F песарии е показан при гъбични и трихомоназни инфекции на влагалището, предизвикани от дрождеподобни гъби от рода Кандида и от *Trichomonas vaginalis*.

Използва се за профилактика и лечение на гъбични инфекции на влагалището и при продължително лечение с антибиотици или с медикаменти, подтискащи имунната система.

**ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Информирайте лекуващия лекар за вашите предишни заболявания!

Свръхчувствителност към някое от веществата, включени в състава на продукта.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Нистатин F песарии не се прилагат при установена свръхчувствителност към някое от веществата, включени в състава на продукта.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Информирайте Вашия лекар, ако приемате други лекарства!

Възможно е компрометиране на ефекта на локални противозачатъчни средства средства при съвместна употреба с Нистатин F песарии.

**СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ
ПАЦИЕНТИ**

Няма данни за нежелани ефекти върху плода, затова Нистатин F песарии може да се назначава при бременни.

**ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С
МАШИНИ**

Препаратът може да се приема по време на шофиране и/или работа с машини!

**ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Дневната доза и продължителността на лечението се определят от лекуващия лекар!

Прилага се вагинално по 1-2 броя, 2 пъти дневно.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

При поява на други оплаквания по време на лечението с продукта, освен тези за които е назначен, информирайте Вашия лекар!

Нистатин F песарии се понася добре. Рядко се наблюдават локално дразнене и алергични реакции, които отзвучават след прекъсване на лечението.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25⁰C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца !

СРОК НА ГОДНОСТ

1 /една/ година от датата на производство

ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

Юни, 2001