

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 14.06.2003 г.

Моля внимателно да прочетете тази листовка, преди да приемате това лекарство. Листовката съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка, тъй като може пак да се наложи да я прочетете.

Ако след прочитането все още имате въпроси, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет.

NEO - ANGIN ® – ZUCKERFREI

НЕО – АНГИН – БЕЗ ЗАХАР

Състав:

Една таблетка за смучене от лекарствения продукт съдържа:

2,4 – dichlorobenzyl alcohol	1.20 mg.
amylmetacresol	0.60 mg
levomenthol	5.72 mg

Помощни вещества:

Масло от звездовиден анасон, масло от лютива мента, течен малтитол, винена киселина, червен оцветител А (Е124).

Съдържание на малтитол: 2579,59mg

Данни за опаковката:

Първична опаковка – блистери от поливинил хлорид /алуминий

Вторична опаковка – картонена кутия, съдържаща 24 таблетки за смучене

Показания:

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

Противопоказания:

Кога не трябва да употребявате Neo – ангин – без захар?

При свръхчувствителност към някои от съставките на лекарствения продукт. Лекарствения продукт е противопоказан за приложение при деца под 6 годишна възраст.



Какво трябва да знаете ако сте бременна или кърмачка?

За *Нео – ангин – без захар* няма клинични данни за влияние при бременност и кърмене. Този продукт трябва да се приема с внимание от бременни и кърмещи жени. Поради недостатъчна информация, не е възможно изцяло да се изключи риска за зародиша, ето защо ако сте бременна или кърмите, моля консултирайте се с лекар преди приемането на този лекарствен продукт.

Предупреждения:

Приложението при малки деца може да доведе до бронхоспазъм и гърчове.

В случай, че симптомите не се повлияват или се влошават, моля консултирайте се с личния си лекар. Лекарството съдържа заместител на захарта, течен малититол, който се разгражда под действието на инсулин. Това трябва да се вземе предвид ако страдате от диабет. Съдържа също така оцветителя Е124, който може да причини алергичен тип реакции, включително астма. Тези реакции се срещат най-често при хора, които имат свръхчувствителност към ацетилсалицилова киселина.

Пациенти, страдащи от вродена фруктозна непоносимост не трябва да приемат това лекарство.

Лекарствени взаимодействия:

Няма известни при перорален прием на този лекарствен продукт.

Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Инструкциите, дадени по-долу, се прилагат ако лекарят не е предписал друго. Моля, съблюдавайте тези инструкции, за да бъде лечението Ви с *Нео – ангин – без захар* ефективно и безвредно.

По колко и колко често трябва да приемате Нео – ангин – без захар?

За възрастни и деца над 6 годишна възраст препарата се прилага по 1 таблетка на всеки 2-3 часа за смучене в устата. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене. При възникване на проблеми консултирайте се с лекар.



Нежелани лекарствени реакции:

Рядко са възниквали нежелани реакции, независимо от широкото прилагане на този лекарствен продукт. Наблюдавани са само възпаление на оралната и стомашна мукоза. Все пак е възможно проява на алергични реакции.

Срок на годност:

Срокът на годност е 2 години и е означен върху кутията и блистера.

Да не се използва след тази дата!

Как трябва да се съхранява Heo – ангин – без захар?

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Да се съхранява в оригинална опаковка при температура не надвишаваща 25° C.

Притежател на разрешението за употреба:

Divapharma – Knufinke Arzneimittelwerk GmbH
Motzener Strasse 41
D-12277 Berlin, Germany

Последна редакция на информацията: Януари 2005 г.

Рег. №



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля внимателно да прочетете тази листовка, преди да приемате това лекарство. Листовката съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка, тъй като може пак да се наложи да я прочетете.

Ако след прочитането все още имате въпроси, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет.

NEO - ANGIN ® – ZUCKERFREI

НЕО – АНГИН – БЕЗ ЗАХАР

Състав:

Една таблетка за смучене от лекарствения продукт съдържа:	
2,4 – dichlorobenzyl alcohol	1.20 мг.
amylmetacresol	0.60 мг
levomenthol	5.72 мг

Помощни вещества:

Масло от звездовиден анисон, масло от лютива мента, течен малтитол, винена киселина, червен оцветител A (E124).
Съдържание на малтитол: 2579,59mg

Данни за опаковката:

Първична опаковка – блистери от поливинил хлорид /алуминий

Вторична опаковка – картонена кутия, съдържаща 24 таблетки за смучене

Показания:

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

Противопоказания:

Кога не трябва да употребявате Neo – ангин – без захар?

При свръхчувствителност към някои от съставките на лекарствения продукт. Лекарствения продукт е противопоказан за приложение при деца под 6 годишна възраст.

