


NARAMIG™
film-coated tablets
НАРАМИГ™
филмирани таблетки
naratriptan



Придобиете ги
преди да
създадате
23.06.04. днес
и използвайте

Тази листовка ви дава информация само за таблетките Naramig. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете да ги приемате. Тя съдържа най-важното за лекарството. Ако искате да получите допълнителна информация или съвет, обърнете се към лекар.

Наименование на лекарството

Името на лекарство е Naramig (Нарамиг). То е под формата на филмирани таблетки.

Какво съдържа Naramig

Всяка таблетка Naramig съдържа 2,5 mg от лекарственото вещество naratriptan (наратриптан) под формата на naratriptan hydrochloride. Лекарството съдържа и следните помощни вещества: лактоза, безводна; микрокристална целулоза; кроскармелоза, натриева сол; магнезиев стеарат; титанов диоксид; триацетин; жълт железен оксид (E172); индиго кармин алуминий (E132).

Всяка опаковка съдържа две таблетки Naramig.

Как действа лекарство

Смята се, че главоболието при мигrena се причинява от болезнено възпаление и разширение на кръвоносните съдове в главата.

Naramig облекчава мигрената като стеснява кръвоносните съдове посредством въздействие върху нервните окончания в тях.

Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България

Naramig се произвежда от Glaxo Operations UK Ltd, Ware, Hertfordshire, UK. Притежател на разрешението за употреба е Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, UK, представляван в България от GlaxoSmithKline Export Ltd., с адрес: София 1408, кв. Иван Вазов, ул. Дим. Манов, бл.10.

За какво се използва Naramig

Вашият лекар е избрал това лекарство, защото е подходящо за вас и вашето състояние. Таблетките Naramig се използват за лечение на остри мигренозни пристъпи с или без аура.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ УПОТРЕБАТА НА NARAMIG

Трябва да знаете, че мигрената може да ви направи сънливи. В такова състояние не шофирайте и не работете с машини.

Ако отговорите с “Да” на някой от следните въпроси, посъветвайте се с лекаря преди да започнете прием на това лекарство.

- Дали мигренозното ви главоболие в момента се различава от обичайните ви пристъпи на миграна?
- Казвали ли са ви, че сте алергични към Naramig, naratriptan или към някоя от помощните съставки на лекарството?
- Алергични ли сте към сулфонамиди? Ако сте алергични към някое лекарство, но не сте сигурни дали принадлежи към тази група, попитайте лекаря.
- Имали ли сте сърдечни пристъпи или пък страдате от стенокардия?
- Съобщавано ли ви е, че при вас съществува повишен риск от сърдечно заболяване? Може да считате, че рисъкът от сърдечно заболяване е по-висок, ако сте мъж над 40 години или жена в менопауза, ако боледувате от диабет, имате високо съдържание на холестерол в кръвта, или сте с наднормено тегло. Рисъкът от сърдечно заболяване е по-висок, ако ваши близки родници са страдали от такова заболяване.
- Страдате ли от заболяване на периферните кръвоносни съдаве (болка в задната част на краката по време на ходене) или сте забелязали, че ръцете/краката ви често са студени и/или спромумен цвят?



- Имате ли чернодробно или бъбречно заболяване?
- Бременна ли сте или се опитвате да забременеете?
- Кърмите ли?
- Дали сте на възраст под 18 години или над 65?
- Приемате ли други лекарства за мигрена, съдържащи sumatriptan (суматриптан) или ерготаминови вещества, към които спадат метизергид и дихидроерготамин.

Вашият лекар трябва да знае за другите лекарства, които употребявате, включително и тези, които си купувате сами, без предписание.

Ако сте бременна или кърмите

Не е установено дали съществува риск за вас или плода при употреба на Naramig.

Само лекарят може да прецени дали се налага приемането на Naramig, в случай че очакваната полза за майката е по-голяма от възможния риск за плода.

Употребата на Naramig от кърмачки трябва да бъде под стриктно лекарско наблюдение.

Как да приемате Naramig таблетки

Приемайте Naramig таблетки, както ви е предписал лекарят.

Трябва да приемате таблетките веднага щом се появят мигренозните симптоми, но това може да стане и по всяко време на пристъпа.

Ако мигренозните симптоми се появят отново, може да вземете още една таблетка, но не по-рано от 4 часа след първата.

Не употребявайте повече от 2 таблетки Naramig за 24 часа.

Гълтайте таблетката цяла с вода.

Ако до 4 часа след първата доза не получите облекчение на мигренозния пристъп, не приемайте втора таблетка. Можете да приемете други лекарства за облекчаване на болката, ако не съдържат суматриптан или ерготаминовите съединения метизергид и дихидроерготамин.

СЛЕД КАТО ПРИЕМЕТЕ ЛЕКАРСТВОТО

Повечето хора, които употребяват това лекарство, нямат проблеми. При малка част от тях могат да се получат нежелани реакции.

Някои хора са алергични към лекарства. Ако скоро след като сте приели Naramig се появят следните симптоми, трябва да СПРЕТЕ приема на лекарството и веднага да потърсите лекарска помощ:

- Внезапни хрипове и болка или тежест в гърдите.
- Подуване на клепачите, лицето, устните, устата или езика.
- Обриви или уртици където и да е по тялото.

Възможни са реакции на свръхчувствителност (алергия) с различни прояви, вариращи от кожни обриви до алергичен шок.

При малка част от пациентите може да се появи чувство на болка, дразнене, изтръпване, топлина, тежест или стягане в някоя част от тялото, включително гърдите или гърлото след лечение с Naramig. Обикновено тези симптоми преминават бързо. Ако обаче те не отзивчат или са силно проявени, незабавно съобщете на вашия лекар и не приемайте повече никакви лекарства, освен ако лекарят не ви каже. Той може да реши да прекратите лечението.

Малка част от пациентите могат да установят, че ръцете и краката им са студени, бледи и/или с променен цвят. В тези случаи не преустановявайте лечението, но съобщете за това на вашия лекар при следващия преглед. Ако обаче установите, че ръцете или краката ви постоянно са с виолетов цвят, спрете приема на лекарството и незабавно се консултирайте с лекаря си.

Ако ви се гади или повръщате след прием на Naramig таблетки, не преустановявайте лечението, но съобщете за това на вашия лекар при следващия преглед.

Посъветвайте се с лекаря в случай че се появят някакви други симптоми, които не са описани в тази листовка.

Какво да направите, ако сте приели твърде много

Важно е да спазвате предписаната доза. Ако инцидентно сте приели повече таблетки, потърсете лекарска помощ.



КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ NARAMIG

Съхранявайте Naramig таблетки, както и всяко друго лекарство на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте Naramig таблетки при температура под 30°C.

Не приемайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, обозначена върху блистера и кутията!

Запомнете! Това лекарство е за вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите като вашите.

Допълнителна информация

Тази листовка не ви дава пълна информация за лекарството.

Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, попитайте лекуващия лекар.

Може да ви се наложи да прочетете тази листовка отново, затова не я изхвърляйте докато употребявате лекарството в опаковката.

Naramig (Нарамиг) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline Group of companies.

Дата на последната редакция: 04/2004 г.
(in line with GCT_issue06/07May2003)

