

Информация за пациента

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 25.07.04

Отривин® дозиращ назален спрей (овлажняваща формула) 0.1%

Otrivin® metered dose spray (moisturising formula) 0.1%

Тази листовка Ви предоставя полезна информация за Вашето лекарство. Моля, прочетете я внимателно, преди да започнете да го приемате. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

1. Какво е Отривин®?

Отривин® е назален деконгестант, който бързо отпушва запушения нос. Овлажняващата формула съдържа съставки, които спомагат за предотвратяване на сухотата и дразненето на носната лигавица.

Отривин® 0.1% (овлажняваща формула) под формата на дозиращ назален спрей съдържа като активна съставка 1 mg/ml xylometazoline hydrochloride. Съдържанието на опаковката е 10 ml. В Отривин® (овлажняваща формула) има също такаベンзалкониев хлорид, динатриев едетат, натриево-фосфатен буфер, натриев хлорид, сорбитол, метилхидроксипропилцелулоза и дестилирана вода.

2. Как действа и за какво се използва Отривин®?

Отривин® отпушва запушения нос и Ви дава възможност да дишате по-лесно. Отривин® се използва за облекчаване на запушването на носа причинено от простудни заболявания, сенна хрема, или други алергични ринити, синуити.

Ефектът на Отривин® започва в рамките на няколко минути и продължава до 10 часа.

Той се понася добре дори от пациенти с чувствителна носна лигавица.

Отривин® може да се използва и при възпаление на ухото за отбъбване на назофарингеалната лигавица.

Отривин® може да Ви бъде предписан от Вашия лекар, ако Ви предстои риноскопия (метод за визуално изследване на носната кухина през носовия отвор).

3. Преди да използвате Отривин®

Не трябва да употребявавте Отривин®, ако:

- сте алергични към някоя от съставките;
- скоро са Ви правили операция през носа.



Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако е налице някое от изброените състояния, тъй като Отривин® не е подходящ за Вас.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Отривин®, ако:

- страдате от високо кръвно налягане, заболяване на сърдечно-съдовата система или на щитовидната жлеза, глаукома или диабет.
- вземате антидепресанти, включително и лекарства от групата на т. нар. МАО-инхибитори.

В тези случаи се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Какво трябва да помните, когато използвате Отривин®?

Както и другите медикаменти за лечение на запущен нос, при много чувствителни пациенти Отривин® може да причини нарушения на съня, виене на свят, аритмия, повишено кръвно налягане, трепор. Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте обезпокоени от подобни симптоми.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите не отзучават. Както и другите локални деконгестанти, Отривин® не трябва да се използва повече от 5 дни и не бива да се употребява при хронично възпаление на носната лигавица. Продължителната или прекомерната употреба може да причини повторно запушване на носа или влошаване.

Не превишавайте препоръчаната доза, особено при деца и по-възрастни пациенти.

Бременност или кърмене

Не се препоръчва употребата на Отривин® по време на бременността.

Ако кърмите, консултирайте се с Вашия лекар, преди да го използвате.

4. Как трябва да употребявате Отривин®?

Дозировка за възрастни и деца над 6 години

Отривин® 0.1% дозиращ назален спрей.

3-4 пъти дневно: 1 впръскване от дозиращия спрей във всяка ноздра.

Инструкции за употреба

Дозиращ назален спрей

1. Преди първата апликация натиснете дозатора, направете няколко напомпвани движения във въздуха, докато пръснете струя от спрея. При следващата апликация, дозиращият спрей ще е готов за непосредствена употреба.
2. Издухайте си носа.
3. С изправена глава вкарайте наконечника в ноздрата.



4. Натиснете помпата и едновременно с това поемете малко въздух., за да осигурите оптимално разпределение на спрея.
5. Повторете процедурата и за другата ноздра.
6. Затворете капачката след употреба.

Дозиращият спрей позволява прецизно дозиране и осигурява оптимално разпределение на разтвора по повърхността на носната лигавица.

Какво да се прави, ако е пропусната една доза?

Ако сте пропуснали една доза и е изминал 1 час, можете да я вземете. В противен случай прескочете пропуснатата и се върнете към нормалната дозировка. Не използвайте двойна доза.

Otrivin® не бива да се прилага непрекъснато за период по-дълъг от 5 дни. Ако се налага повторно лечение с Otrivin®, приложението трябва да се започне след прекъсване от наколко дни, с цел да се избегне развитието на медикаментозен ринит.

Какво да се прави, ако е погълнат твърде много Отривин® ?

Ако случайно е прието голямо количество Отривин®, информирайте незабавно Вашия лекар.

5. Какви нежелани ефекти може да причини Отривин® ?

Отривин® обикновено не предизвиква проблеми. Като при всички лекарства обаче, при някои хора могат да се появят нежелани ефекти.

Спрете употребата на Отривин® и незабавно се консултирайте с Вашия лекар, ако се появи някой от следните нежелани лекарствени реакции: алергични реакции (кожни обриви, сърбеж), преходни зрителни нарушения, аритмична или участена сърдечна дейност.

Понякога могат да се появят следните слаби нежелани ефекти: чувство на парене в носа и гърлото, локално дразнене и сухота на носната лигавица, гадене, главоболие. Следните нежелани реакции могат да се наблюдават в изолирани случаи: безсъние, световъртеж, умора, повишено кръвно налягане. Продължителната или прекомерната употреба може да причини хроничен оток на носната лигавица.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някакъв ефект, който не е посочен по-горе, но считате, че може да се дължи на употребата на Отривин® .

6. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

При продължителна употреба и във високи дози на медикамента не могат да се изключат системни ефекти върху сърдечно-съдовата система, което може да наруши способността за шофиран и работа с машини.



7. Допълнителна информация

Срок на годност

Не използвайте Отривин® след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Условия на съхранение

Да се пази от топлина (съхранявайте при температура под 30° C).

Пазете всички лекарства далеч от достъпа на деца!

8. Притежател на разрешение за употреба.

Novartis Consumer Health SA, Nyon, Швейцария.

9. Последна редакция на листовката – ноември 2002 г.

