



**ИАЛ
СО ОБРЕНО!**
дата 12.03г.

Информация за пациента

28.8.2001

Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да прилагате това лекарство, защото тя съдържа важна информация за Вас.

Това лекарство се отпуска по лекарско предписание при деца от 6 месеца до 3 години. При деца над 2 години се отпуска без рецепт. Въпреки това трябва да използвате това лекарство внимателно, за да получите най-добри резултати.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете пак.

Ако имате нужда от повече информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите Ви не се подобрят до 5 до 7 дни, трябва да се консултирате с лекар.

PANATUS® / ПАНАТУС
сироп 4 mg/5 ml / сироп 4 мг/5 мл
Butamirate / бутамират

за облекчение на кашлица

Състав

5 ml от сиропа (1 мерителна лъжичка) съдържа активно вещество 4 mg butamirate citrate

Помощи вещества:monoхидратна лимонена киселина, 70% сорбитол, глицерол, захарин натрий, натриев бензоат, лимонена есенция, натриев хидроксид, пречистена вода.

Как действа Panatus сироп?

Panatus сироп е лекарство с централно действие за симптоматично лечение на кашлица и/или облекчаване на дразнеща кашлица (противокашлично средство). Той предотвратява сухата и дразнеща кашлица, намалява напрежението на бронхиалната мускулатура, едновременно засилва еспекторацията (отделяне на храчки), облекчава дишането и болките в гръденния кош. Това има благоприятен ефект за подобряване на дихателния капацитет и газовите концентрации в кръвта. Panatus се различава от наркотичните противокашлични средства химически и по своите фармакологични ефекти и не предизвиква зависимост.

Лекарството е подходящо и за деца и диабетици.

Кога се използва Panatus сироп ?

Panatus сироп се препоръчва за симптоматично лечение на дразнеща суха кашлица от различен произход (като остри и хронични инфекции на дихателните пътища, кашлица преди и след диагностични или терапевтични процедури на бронхите; преди и след операция; при коклюш).

Кой не трябва да взема Panatus?

Не използвайте Panatus, ако сте свръхчувствителни към butamirate или някоя от другите съставки.

Предпазни мерки и предупреждения

Трябва особено да внимавате с Panatus сироп, ако имате тежко увредена бъбречна функция.

Ако започнете да вземате това лекарство без да питате лекар, а кашлицата не спре след 5 до 7 дни от лечението, консултирайте се с лекаря си.

Ефективността и безопасността на Panatus не са установени при кърмачета под 6-месечна възраст и поради това Panatus не трябва да се дава на тях.

Бременност и кърмене



Посъветвайте се с лекуващия си лекар или Вашия фармацевт преди да започнете да вземате каквито и да било лекарства.

Въпреки, че няма данни за увреждащ ефект на butamirate citrate, употребата му не се препоръчва през първото тримесечие на бременността. За употребата му по време на по-късната бременност трябва да се посъветвате с лекуващия си лекар.

Няма налични данни и за проникването му в кърмата, така че употребата му по време на кърмене не се препоръчва.

Ако забременеете по време на лечение с Panatus, консултирайте се с лекуващия си лекар.

Шофиране и работа с машини

Няма данни за влияние на Panatus върху способността на болния да шофира или да работи с машини.

Прием на други лекарства

Консултирайте се с лекуващия си лекар или фармацевт, ако вземате някакви други лекарства.

Няма съобщения за вредни взаимодействия с други лекарства.

Не пийте алкохол по време на лечение с Panatus.

Важна информация за някои от съставките на Panatus

5 ml от сиропа съдържат 1.75 g sorbitol. С всяка доза Вие поемате до 10.5 g sorbitol, ако дозата Ви е 6 мерителни лъжички, до 5.25 g sorbitol, ако дозата е 3 мерителни лъжички и до 3.5 g sorbitol, ако вземате 2 мерителни лъжички сироп. Лекарството не е подходящо за пациенти с вродена непоносимост към фруктоза. То може да предизвика стомашно-чревни проблеми.

Бензоената киселина има слаб дразнещ ефект върху кожата, очите и лигавицата. Тя може да увеличи риска от жълтеница при кърмачетата.

Дозировка и метод на приложение

Panatus се отпуска по лекарско предписание при деца от 6 месеца до 3 години. При деца над 3 години се отпуска без рецепт за лечение на по-леки заболявания.

Обичайните дози Panatus са дадени в таблицата:

| Възраст | Дозировка | Честота |
|------------------------------------|-----------|--------------------|
| Възрастни (и в напреднала възраст) | 6 лъжички | 3 до 4 пъти дневно |
| Деца над 9 години | 3 лъжички | 4 пъти дневно |
| Деца от 6 до 9 години | 3 лъжички | 3 пъти дневно |
| Деца от 3 до 6 години | 2 лъжички | 3 пъти дневно |
| Деца от 1 до 3 години | 1 лъжичка | 3 пъти дневно |
| Деца от 6 месеца до 1 година | ½ лъжичка | 4 пъти дневно |

1 мерителна лъжичка = 5 ml сироп = 4 mg butamirate citrate

Вземайте сиропа (или го давайте на децата) преди или след хранене. Отмервайте сиропа с приложената мерителна лъжичка, прегъльщайте го с малко течност.

Когато прилагате лекарството за самолечение, не надхвърляйте препоръчваната дневна доза.

Самолечението може да продължи 5 до 7 дни. Ако искате да вземате лекарството или да го дадете на дете за по-дълго време, трябва да се консултирате с лекар.

Ако имате чувството, че ефектът на лекарството е твърде силен или твърде слаб, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако вземете повече Panatus от колкото трябва





Ако сте взели повече сироп, отколкото трябва (или сте го дали на дете), незабавно се консултирайте с лекуващия си лекар или фармацевт.

Опитайте се да предизвикате повръщане.

Твърде висока доза от Panatus сироп може да предизвика сънливост, повръщане, некоординираност на движенията (атаксия), коремна болка, диария, възбуда и слабо понижение на артериалното налягане.

Ако забравите да вземете Panatus

Не вземайте двойна доза, ако сте забравили да вземете предишната доза.

Вземайте лекарството (или го давайте на детето) всеки ден приблизително по едно и също време на деня. Ако сте забравили да вземете една доза, вземете я веднага след като се сетите, но ако остават само няколко часа до следващата доза, пропуснете забравената доза и вземете следващата в обичайното време.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Panatus може да има нежелани реакции.

Следните нежелани реакции може да се наблюдават по време на лечение с Panatus: кожен обрив, stomашно-чревни нарушения (гадене, повръщане, диария) и замайване. Тези нежелани реакции са редки и слабо изразени. Дори и при продължително лечение, не са установени нежелани реакции върху жизнените функции и работата на другите органи. Специално предимство на това лекарство е, че не са били наблюдавани нежеланите реакции, характерни за наркотичните противокашлични средства.

Ако забележите някакви нарушения, които не можете да си обясните, спрете веднага приема на лекарството и се консултирайте с лекуващия си лекар или фармацевт.

Ако забележите някакви нежелани реакции, включително такива, които не са споменати в тази листовка, моля уведомене лекуващия си лекар или фармацевт.

Съхранение и срок на годност

Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.

Да се пази от светлина. Да се съхранява при температура до 25°C.

Да се пази на места, недостъпни за деца.

Начин на отпускане

Отпуска се по лекарско предписание при деца от 6 месеца до 3 години. При деца над 3 години се отпуска без рецепт.

Опаковка

200 мл сироп

Произведено от

Krka, d. d., Novo mesto, Slovenia

Последна редакция

16 август, 2001 г.

