

Pikovit® forte
Пиковит® форте
Обвити таблетки витамини

Без захар

Какво съдържат таблетките Pikovit forte ?

Всяка обвита таблетка съдържа:

Retinol (витамин А)	5000 IU
Cholecalciferol (витамин D ₃)	400 IU
Ascorbic acid (витамин С)	60 mg
Nicotinamid (никотинамид)	20 mg
Tocopherol acetate (витамин Е)	15 mg
Calcium pantothenate (калциев пантотенат)	10 mg
Pyridoxine hydrochloride (витамин В ₆)	2.00 mg
Riboflavine phosphate (витамин В ₂)	1.70 mg
Thiamin nitrate (витамин В ₁)	1.50 mg
Folic acid (фолиева киселина)	0.40 mg
Cyanocobalamin (витамин В ₁₂)	6.00 µg

Помощни вещества: малтитол, малтитол сироп, манитол, аспартам (съдържа фениланин), повидон, магнезиев стеарат, глицерол, капол 600, кастор масло, полисорбат 80, колоидален силика гел, β-каротен, титаниев диоксид (E171) и аромат мандарини.

Как действат таблетките Pikovit forte?

Таблетките Pikovit forte съдържат 11 жизнено необходими витамини в количества, които съответстват на препоръчителните дневни дози за деца на 7 и повече години. Тъй като таблетките не съдържат захар, която спомага за растежа и развитието на бактерии, те не причиняват увреждане на зъбите (кариеси). Таблетките съдържат манитол, малтитол и аспартам, които им придават приятен вкус.

Витамините са високобиологични субстанции, които регулират различни биохимични процеси в тялото. Витамините от групата на В complex (В₁, В₂, В₆, В₁₂, пантотеновата киселина и никотинамид) участват в обмяната на въглехидратите, белтъчините и мазнините. Фолиевата киселина е необходима за нормалната продукция, регенерация и функциониране на кръвните клетки. Витамин А е необходим за развитието на епителните клетки и за синтеза на зрителните пигменти. Витамин D спомага за правилното усвояване на калций и на добрата костна и зъбна минерализация. Витамин С подпомага абсорбцията на желязото и подпомага различни окислително-редукционни процеси в тялото. Витамин Е е физиологичен антиоксидант, който предпазва клетъчните мембрани от увреждане и съхранява клетъчната функция. Таблетките Pikovit forte съдържат натурални оцветители, които могат да променят цвета си с течение на времето, без това да се отрази върху качеството им.

Кога трябва да приемате таблетките Pikovit forte?

PIKOVIT® forte е показан за профилактика и лечение на витаминен дефицит (хиповитаминози и авитаминози) и при заболявания и състояния, при които е необходимо



допълнително приемане на витамини, при продължително приемане на антибиотици, при физическа и умствена преумора, при липса на апетит и податливост към инфекции, за подобряване на общото състояние след боледуване, при бременност след консултация с лекар.

Какво трябва да знаете преди да започнете да приемате таблетките Pikovit forte?

Не давайте таблетки Pikovit forte на деца, ако те са алергични към някоя от съставките на препарата или ако те имат хипервитаминоза (повишени количества) А и D.

Таблетките Pikovit forte не се препоръчват при деца под 7 годишна възраст.

Бремените жени и кърмещите майки могат да приемат витамини след консултация с лекар.

На децата не трябва да се дават по-високи от препоръчителните дневни дози.

Високите дози от витамините А и D могат да причинят хипервитаминоза (повишени количества) ако се приемат в по-високи дози през определен период.

Преди едновременното приемане на продукти, съдържащи витамини и витамини-минерали, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Диабетиците могат да приемат Pikovit forte таблетки, независимо, че трябва да имат в предвид, че една таблетка съдържа 0.6 g maltitol. Инсулинът е необходим за метаболизма на maltitol, но поради слабата хидролиза и стомашно-чревна абсорбция нуждите от инсулин са ниски. Енергетичната стойност на една таблетка е приблизително 6 kJ (1.4 kcal).

Таблетките Pikovit forte съдържат **aspartame**, съдържащ phenylalanine и затова не трябва да се приемат от хора с фенилкетонурия.

Как да приемате таблетките Pikovit forte?

Деца на 7 и повече години трябва да примат по 1 таблетка дневно след хранене.

Децата трябва да разтварят таблетките Pikovit forte в уста.

В случаите на безапетитие, децата трябва да приемат таблетките в продължение на 2 месеца, докато при други нарушения да се приемат както обикновено, според нуждите.

Нежелани реакции

Таблетките Pikovit forte когато се приемат съгласно препоръките, рядко причиняват нежелани реакции. Възможна е поява на алергични реакции.

При възникване на алергия, детето трябва да спре приема на таблетките и да се консултира с Вашия лекар или фармацевт.

Една таблетки съдържа 0.6 g maltitol. Приемането на по-високи дози от препоръчителните може да причини диария.

Как да се съхраняват таблетките Pikovit forte?

Да се съхранява до 25°C. Да се пази от влага и светлина.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отпечатан на опаковката.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Начин на предписване

Без лекарско предписание.

Опаковка

30 обвити таблетки

Производител и притежател на разрешението за употреба

KRKA, d. d., Novo mesto, Slovenia

Дата на последната корекция 2000

