

ИАЛ
ОДОБРЕН ОТ
ДАТА 30. 05. 2005

Информация за пациентта.

Моля, прочетете внимателно!

**Pinosol® nasal drops
Пиносол® капки за нос**

Състав

Лекарствени вещества:

Pine oil 375,2 mg, Peppermint oil 100 mg, Eucalyptus oil 50 mg, Tocopherol acetate 170 mg, Thymol 3,2 mg, Guaiazulene 2,0 mg в 10 g разтвор.

1 ml = 25 капки

Помошни вещества:

Бутилхидроксианизол, гликолизирано бадемово масло, растително масло.

Лекарствена форма и опаковка

Капки за нос

Съдържание на една опаковка:

10 ml

Производител и притежател на разрешението за употреба

Zentiva a.s.,
Hlohovec, Slovak Republic

Фармакотерапевтична група

Лекарствен продукт от растителен произход за назално приложение.

Действие

Смес от етерични масла и чисти природни субстанции в растително масло с противомикробно действие. Подобрява кръвообращението на лигавицата на носа и възстановява нейните физиологични функции.

Показания

Лекарственият продукт се прилага за симптоматично лечение на хрема и други възпалителни заболявания на лигавицата на носа и носоглътката и при състояния след операции в носната кухина. Вдишването на лекарствените вещества може да повлияе



благоприятно инфекциозни възпалителни заболявания на дихателните пътища (ларингит, трахеит, бронхит). Инхалирането се препоръчва при възрастни и деца над 12 години.

Без лекарско предписание Пиносол може да се прилага само при протичащи без усложнения хреми. Лекарственият продукт е предназначен за употреба от възрастни, юноши и деца над 6 години.

Противопоказания

Пиносол не трябва да се прилага при свръхчувствителност към някое от лекарствените вещества или към някое от помощните вещества, както и при възпаления на носната лигавица на алергична основа, при бронхиална астма и коклюш, по време на кърмене, да не се прилага при деца под 6 години.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Консултирайте се с Вашия лекуващ лекар относно целесъобразността на едновременното прилагане на Пиносол и други лекарствени продукти.

Съществува опасност от бронхоспазъм, загуба на съзнание и гърчове, ако случайно лекарственият продукт попадне в близост до носа или устата на кърмаче (напр. с ръцете на майката). Да не се употребява за инхалации при деца под 12 години.

Ако симптомите на заболяването не се подобрят по време на лечението или дори се влошат, посъветвайте се с Вашия лекар.

Бутилхидроксианизол (помощно вещество) може да предизвика дразнене на очите, кожата и лигавиците.

Лекарствени взаимодействия

Не са установени.

Дозировка и начин на приложение

Възрастни: по няколко капки във всяка ноздра, първоначално на интервали от 1 час, последвани от по-дълги интервали между отделните дози.

За инхалации с помощта на инхалационен апарат, при възрастни и деца над 12 години 2 ml от лекарствения продукт се прибавят в 1 литър гореща вода.

При деца над 6 години се накапват 1-2 капки 3-4 пъти дневно.

Лекарственият продукт обикновено се употребява 5 (3-7) дни.

Предозиране

Предозирането е малко вероятно. В случай на предозиране или случайно погълдане от дете, консултирайте се с Вашия лекар.



Нежелани лекарственни реакции

В изолирани случаи по време на употреба на лекарствения продукт могат да се появят сърбеж, парене, зачервяване или оток на носната лигавица или усилване на бронхоспазмите.

В случай на нежелани лекарствени реакции или други необичайни реакции е необходимо да се консултирате с Вашия лекар относно по-нататъшната употреба на лекарствения продукт.

Съхранение

Да се съхранява при температура под 25°C. Да се пази от влага и светлина.

Срок на годност

4 години

Внимание

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, който е отбелаязан върху опаковката.

Последна редакция на текста: м. юни 2001 г.

Адрес за контакти

Търговско представителство в България
Zentiva International a.s.
бул. "Н. Вапцаров" № 25, офис 2
1407 София
тел. 962 41 40, 962 41 91

