

PHARMATEX® 20 mg vaginal tablet
ФАРМАТЕКС® 20 мг вагинални таблетки
Benzalkonium Chloride

И А Л
ОДОБРЕНО!
ДАТА 13.07.04

Моля прочетете внимателно тази листовка, преди да приемете това лекарство.
Ако имате въпроси или съмнения обърнете се за повече информация към Вашия лекар или фармацевт. Запазете тази листовка за справка.

Разучете внимателно указанието за употреба, за да се избягнат всички възможни грешки при употреба на продукта ФАРМАТЕКС® вагинални таблетки. ЗАПОМНЕТЕ: не употребявайте за измиване след полов акт сапун, защото сапуна неутрализира ефекта на средството, което убива сперматозоидите. Може да се измиете ВЪНШНО с ЧИСТА вода. Изчакайте най-малко 2 часа преди да приложите вагинална промивка.

ФАРМАТЕКС® вагинални таблетки трябва да се използва независимо от етапа на Вашия менструалния цикъл.

СЪСТАВ: активно вещество Benzalkonium Chloride 20mg; помощни вещества натриев бикарбонат, безводна лимонена киселина, колоиден силициев диоксид, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, лактоза, макрогол 6000.

ФАРМАКОТЕРАПЕТИЧЕН КЛАС: локално противозачатъчно средство(G)
ПОКАЗАНИЯ: за противозачатъчно действие на място. Този метод намалява значително опасността от забременяване, без напълно да я подтиска, ето защо неговата ефективност зависи от строгото спазване на правилата за употреба.

ФАРМАТЕКС® вагинални таблетки може да се използва от всяка жена в детеродна възраст, особено подходящ е за жени, на които временно или постоянно е противопоказано приемането на противозачатъчни таблетки или вътрешматочни предпазни средства: спирали, диафрагми и др.; след раждане, при кърмене, след аборт или в периода около менопаузата; когато се налага случайно възникващ бърз противозачатъчен ефект; по време на предпазване с противозачатъчни таблетки, когато е пропусната дозата за деня или има забавяне на приема на таблетка навреме: в този случай ФАРМАТЕКС® вагинални таблетки трябва да се използва за останалите дни от цикъла. Като помощно средство при употребата на вътрешматочни локални противозачатъчни средства (спирала), особено ако са приемани редовно нестериоидни противовъзпалителни лекарствени продукти.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: свръхчувствителност към лекарственото и някое от помощните вещества. Не трябва да се употребява едновременно със сапун и с други продукти за вагинално приложение, освен по лекарско предписание.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА: противозачатъчното действие на

ФАРМАТЕКС® вагинални таблетки зависи в най-голяма степен от правилната употреба на продукта. Това убиващо сперматозоидите средство (спермицид) се разрушава дори от минимални количества - следи от сапун. Външното измиване непосредствено ПРЕДИ или СЛЕД сексуален контакт може да бъде извършвано САМО с чиста вода или със специалното средство ФАРМАТЕКС® - свободно от сапун. Не трябва да се прилага

ФАРМАТЕКС® вагинални таблетки, ако има увреждания по лигавиците на гениталиите или ако се наблюдават такива след приложение на продукта. Ако се наложи друго вагинално лечение с други продукти, изчакайте да завърши лечението с тези продукти, преди да използвате ФАРМАТЕКС® вагинални таблетки отново. ВЗАЙМОДЕЙСТВИЯ: ФАРМАТЕКС® вагинални таблетки не



се препоръчва да се използва заедно със сапуни, с други средства с основна реакция и с други медицински продукти за вагинално приложение(всяко друго локално вагинално лечение може да доведе до пълна липса на локален спермициден ефект).

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ФАРМАТЕКС® вагинални таблетки трябва да се прилагат винаги преди полов акт, независимо от периода на цикъла. Навлажнете леко таблетката: поставете я по дължина дълбоко във вагината 10 минути преди полов акт, най-добре в лежащо положение. Изчакайте 8-10 мин за да се разтвори напълно таблетката и да освободи активното вещество. След това защитното противозачатъчно действие продължава най-малко 3 часа. Преди повторен полов акт поставете нова вагинална таблетка. **НЕЖЕЛЯНИ ЕФЕКТИ:** възможни са алергични реакции, локална непоносимост, чувство за парене и дразнене.

Да не се приемат вагинални таблетки през устата. .

СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхраняват при температура до 25 °C. Да се пази на места, недостъпни за деца. Да не се използват след срока на годност обозначен на опаковката. Дата на последната редакция на листовката: май 2001.

1. схема на Вашата анатомия
2. най-добре поставете таблетката в лежащо положение
3. поставете таблетката, колкото можете по-дълбоко във вагината.

ФАРМАТЕКС® гамата включва:

ФАРМАТЕКС® вагинални капсули,

ФАРМАТЕКС® вагинален крем с дозировъчен апликатор

ФАРМАТЕКС® песари

LABORATOIR INNOTECH INTERNATIONAL

7/9, Avenue Francois Vincent Raspail 94110 Arcueil

ПРОИЗВОДИТЕЛ:INNOTHERA CHOUZY, L'Isle Vert, 41 150 Chouzy-sur-Cisse – France

