



Информация за пациента

21.6.2004

Прочетете тази листовка внимателно, преди да започнете да вземате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате още въпроси, моля попитайте лекуващия си лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори и ако техните симптоми са същите като Вашите.

**Rawel® SR prolonged-release tablets 1.5 mg
indapamide**

**Роуел SR таблетки с удължено освобождаване 1.5 мг
индапамид**

Лекарствено вещество: *indapamide/индапамид*.

Други съставки: хипромелоза, целулоза на прах, лактозаmonoхидратна, повидон, безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, макрогол 400, титаниев диоксид (Е 171).

Име и адрес на производителя и притежателя на разрешението за употреба:
KRKA, d. d., Novo mesto, Slovenia.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RAWEL SR И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Състав

1 таблетка с удължено освобождаване съдържа 1.5 mg indapamide.

Опаковка

Съваема кутия с 20 таблетки с удължено освобождаване в блистерна опаковка (2 блистерни опаковки от 10 таблетки).

Съваема кутия с 30 таблетки с удължено освобождаване в блистерна опаковка (3 блистерни опаковки от 10 таблетки).

Какво представлява Rawel SR?

Rawel SR е лекарство, принадлежащо към групата на диуретиците - лекарства, засилващи отделянето на урината. Той действа като увеличава отделянето на сол и вода през бъбреците и по този начин намалява повишенното артериално налягане. Освен това той намалява артериалното налягане и като повлиява свиването на кръвоносните съдове и намалява съпротивлението им срещу кръвния ток. Rawel SR няма отрицателно влияние върху кръвната захар и обмяната на мастите.

За какво се използва Rawel SR?

Вие трябва да приемате лекарството, ако имате повишено артериално налягане.

2. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ RAWEL SR

Уведомете лекуващия си лекар, ако имате някакво хронично заболяване, обменно нарушение, ако сте свръхчувствителни или ако вземате други лекарства.

Кой не трябва да приема Rawel SR?

Не трябва да приемате Rawel SR:





- ако в миналото сте имали реакция на свръхчувствителност (обрив, сърбеж, затруднение в дишането, много ниско артериално налягане) към *indapamide*, някоя от другите съставки на лекарството или към някое друго лекарство от групата на сулфонамидите;
- ако имате тежка бъбречна недостатъчност;
- ако имате тежка чернодробна недостатъчност или ако имате тежка форма на заболяване на централната нервна система, дължащо се на чернодробно увреждане (чернодробна енцефалопатия);
- ако нивото на калий в кръвта ви е много ниско.

Предпазни мерки и предупреждения

Преди да започнете лечение с *Rawel SR*, уведомете лекуващия си лекар:

- ако имате увредена чернодробна функция;
- ако в миналото сте имали нарушения на нивата на електролитите в кръвта (калий, натрий, калций) или ако сте били обезводнени;
- ако имате диабет;
- ако имате подаграт;
- ако имате бъбречна недостатъчност.

Вашият лекуващ лекар ще реши дали може да приемате лекарството.

По време на лечението трябва редовно да проследявате артериалното налягане и пулса си. Консултирайте се с лекуващия си лекар относно подходящото артериално налягане и пулс и относно датата на следващото ви посещение.

При спортсъстите *Rawel SR* може да предизвика фалшиво положителна реакция при допинг пробите.

Прием на *Rawel SR* с хrани и напитки

Храната и напитките не повлияват ефекта на *Rawel SR*.

Бременност

Посъветвайте се с лекуващия си лекар или фармацевта, преди да вземете някакво лекарство.

Употребата на *Rawel SR* по време на бременност не е изследвана и поради това не се препоръчва.

Кърмене

Посъветвайте се с лекуващия си лекар или фармацевта, преди да вземете някакво лекарство.

Употребата на *Rawel SR* по време на кърмене не се препоръчва.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Indapamide не повлиява бдителността, но може да се появят различни реакции, свързани с понижението на артериалното налягане, особено в началото на лечението или когато се добавя друго лекарство за понижение на артериалното налягане. В такива случаи се препоръчва специално внимание при шофиране или работа с машини.

Кои други лекарства могат да взаимодействват с *Rawel SR*?

Уведомете лекуващия си лекар или фармацевта, ако вземате или накорот от време също вземате някакви други лекарства, дори такива, които не са Ви предписани от лекар.

Едновременната употреба на *Rawel SR* с някои други лекарства може да усилва ефекта на единото или другото лекарство и да предизвика нежелани ефекти.

Уведомете лекуващия си лекар, ако вземате някое от следните лекарства:



- лекарства, съдържащи литий;
- лекарства за лечение на ритъмни нарушения на сърцето;
- лекарства за лечение на сърдечно-съдови заболявания;
- лекарства за лечение на психични заболявания;
- лекарства за лечение на ревматични заболявания;
- лекарства, които може да намалят нивото на калия в организма.

3. КАК ДА УПОТРЕБЯВАТЕ RAWEL SR

Дозировка и метод на приложение

Стриктно спазвайте указанията на лекаря. Не трябва да променяте дозите или да прекъсвате лечението, без преди това да се консултирате с лекуващия си лекар.

Дозата на Rawel SR е една таблетка дневно. Вземайте лекарството по едно и също време всеки ден, за предпочитане сутрин, с малко течност. Важно е да приемате лекарството редовно, тъй като то може да ви помогне да се чувствате добре.

Ако имате чувството, че ефектът на лекарството е твърде слаб, консултирайте се с лекуващия си лекар или фармацевта.

Ако сте приели повече Rawel SR отколкото трябва

Ако сте приели по-висока доза от лекарството, отколкото трябва, консултирайте се веднага с лекуващия си лекар или с фармацевт.

Признаците на предозиране включват: гадене, повръщане, замайване, объркане, гърчове, съниливост, увеличено или намалено отделяне на урина.

Вашият лекуващ лекар ще определи подходящото лечение (стомашна промивка, приложение на активиран въглен, коригиране на киселинно-алкалното равновесие). Ако не можете да отидете на лекар, опитайте се да предизвикате повръщане, за да предотвратите преминаването на лекарството в кръвта ви.

Ако забравите да вземете Rawel SR

Не вземайте двойна доза, ако сте забравили последната.

Продължете с обичайната схема на лечение, като вземете следващата доза в определеното време.

Рискове, ако спрете лечението с Rawel SR

Няма непосредствена опасност, ако спрете приема на лекарството за кратко време. След по-продължителен период от време обаче може да се развият или да се появят отново различни форми на сърдечно-съдово заболяване, дължащи се на нелекуваното високо артериално налягане.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ

Както всички лекарства, Rawel SR също може да има нежелани ефекти.

Нежеланите ефекти са редки.

Може да възникнат умора, замайване, главоболие, мравучкане по крайниците, замайване при рязко изправяне, гадене, запек и сухота в устата. Ако имате предразположение към реакции на свръхчувствителност (алергии, астма), може да се появи кожен обрив.

В някои случаи може да се променят резултатите от лабораторните изследвания.

Много рядко може да възникнат анемия, нарушения на сърдечния ритъм, намалено артериално налягане и панкреатит.

Ако забележите някои нежелани ефекти, дори и ако те не са споменати в тази листовка, моля информирайте лекуващия си лекар или фармацевта.





5. СЪХРАНЕНИЕ НА RAWEL SR

Дата на изтичане на срока на годност

Това лекарство не трябва да се използва след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.

Условия на съхранение

Да не се съхранява при температури над 25°C.

Да се пази на място, недостъпно за деца.

Информация за предписване

Само по лекарско предписание.

Редактирана

13 май, 2004 г.

b
II

